

078

RETINOCOROIDITE TOXOPLÁSMICA MULTIFOCAL. *Nórton S. Severo, Marcelo K. Maestri, J. Melamed*
(Serviço de Oftalmologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre/HCPA, Porto Alegre, RS, Brasil)

A retinocoroidite toxoplásmica, embora muito freqüente em nosso meio, raramente se apresenta na forma de lesões multifocais em pacientes imunocompetentes. Os autores apresentam casos de retinocoroidite toxoplásmica com múltiplas lesões agudas simultâneas, e casos cujas lesões simulavam focos ativos múltiplos. Foram avaliados pacientes que procuraram o Serviço de Oftalmologia do HCPA, com fundoscopias mostrando múltiplas lesões de retinocoroidite compatíveis com toxoplasmose. Foram realizados exames complementares de rotina, incluindo sorologia para toxoplasmose e síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS). Lesões multifocais, ativas, simultâneas e exsudativas, foram observadas em pacientes com AIDS, mas também em indivíduos imunocompetentes. Tais lesões, denominadas "verdadeiras", deixaram cicatrizes características de toxoplasmose após o tratamento específico. Em alguns pacientes, porém, houve uma completa desapareção de alguns focos que, inicialmente, à oftalmoscopia, apareciam como áreas ativas. Posteriormente, esses focos demonstraram tratar-se de edema retiniano associado a isquemia local, decorrentes de vasculite provocada pela lesão primária, sendo denominadas de "falsas" lesões. Os autores, com estes casos, salientam achados que podem simular a presença de múltiplos focos de retinocoroidite, diferenciando as "verdadeiras" das "falsas" lesões.