

O câncer do colo do útero é o mais comum em mulheres e apesar de passível de cura, mantém uma taxa de mortalidade situada entre as maiores do mundo, embora com 100% de cura se diagnosticada precocemente. No Brasil ocupa o 2o lugar em mortalidade por câncer entre as mulheres, superado apenas pelo câncer da mama. Este tipo de neoplasia é de evolução lenta, com etapas bem definidas que permitem a interrupção de seu curso, desde que haja diagnóstico precoce e tratamento oportuno. Uma ampla cobertura pelo exame preventivo de Papanicolau, permite alcançar efetivo controle desse tipo de câncer. No ano de 1995, foram realizados no Laboratório Central do Estado, 195 776 exames, referentes a todos os municípios do estado do RS, sendo que as lesões precursoras ocupam uma porcentagem de 2, 38%, assim distribuídas: NIC I 0, 50%, NIC II 0, 23 %, NIC III 0, 23 %, Carcinomas 0, 05% e HPV 1, 37 %. Procuraremos com este trabalho levantar a prevalência de lesões precursoras de 5 000 pacientes examinadas nos anos de 1993 à 1995, relacionando os resultados com os valores encontrados a nível estadual. Após obtenção dos resultados, procuraremos conscientizar a população da importância da realização do Exame de Papanicolau, como prevenção do Câncer de colo de útero.