



27^a Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

14^o Congresso de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Mercosul
10 a 14 de setembro de 2007

Anais

O USO DE SUTURA INTRADÉRMICA ABSORVÍVEL EM CIRURGIAS UROLÓGICAS

KARIN MARISE JAEGER ANZOLCH; CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA JAEGER, ALEXANDRE GORZIZA, JERUZA LAVANHOLI NEYELOFF, RENAN DEPRÁ DE CAMARGO, MELINA BRAUDE CANTERJI, MARCOS MOTTIN, LEONARDO WINKELMANN E WALTER JOSÉ KOFF.

Introdução: Classicamente - exceto nas cirurgias plásticas, nas pediátricas e em algumas acometendo os genitais - o tegumento é fechado com sutura inabsorvível, necessitando a sua remoção posterior. Por dogma, costume, ou simplesmente por ser mais familiar ao cirurgião, na urologia também ocorre o mesmo, acarretando desconfortos e danos estéticos variáveis aos pacientes. **Objetivos:** Apresentar a nossa casuística inicial com o uso da sutura intradérmica absorvível como uma opção cosmética, segura e praticamente livre de desconforto, amplamente aceita pelos pacientes. **Material e métodos:** Avaliamos 22 pacientes submetidos a cirurgias urológicas em que se utilizou a sutura intradérmica com fio monofilamentar absorvível (Monocryl Caprofil 4-0) para fechamento da pele. Foram analisados os seguintes dados: idade, gênero, tipo de cirurgia, grau de satisfação e presença ou não de complicações. **Resultados:** Independente do gênero ou idade, todos os pacientes mostraram-se satisfeitos com a sutura utilizada e não apresentaram complicações. **Conclusão:** A sutura absorvível intradérmica é uma opção viável, muito bem aceita pelos pacientes, que possibilita não somente uma excelente estética como também elimina o desconforto da remoção dos pontos no pós-operatório.