

**1472****PERFIL CLÍNICO E SOCIODEMOGRÁFICO DE PACIENTES CLÍNICOS QUE RECEBERAM O DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM INTEGRIDADE TISSULAR PREJUDICADA**

Bruna Paulsen Panato, Miriam de Abreu Almeida, Marcos Barragan da Silva, Mariana Palma da Silva, Bruna Engelman. Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

**Introdução:** A Sistematização da Assistência de Enfermagem é um instrumento de informação que busca favorecer a implantação de padrões e critérios de assistência e estabelecer as prioridades. Neste contexto, do Processo de Enfermagem e do uso de linguagens padronizadas, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) já possui uma longa trajetória, utilizando desde 2000 a etapa de diagnóstico de enfermagem (DE) baseado na classificação da NANDA International Inc. (NANDA-I) e do referencial das Necessidades Humanas Básicas. Integridade Tissular Prejudicada (ITP) é um dos DE mais frequentes no Serviço de Enfermagem Médica (SECLIN) e possui como características definidoras apresentar tecido destruído e/ou tecido lesado. **Objetivo:** Caracterizar os pacientes clínicos com o Diagnóstico de Enfermagem Integridade Tissular Prejudicada. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo-exploratório retrospectivo com abordagem quantitativa realizado em hospital universitário nos meses de abril à junho de 2014. Foram analisados 73 prontuários selecionados através de amostragem aleatória simples realizada no SPSS versão 18. Foram incluídos pacientes que receberam o DE ITP no SECLIN no ano de 2013. Não foram previstos critérios de exclusão. A coleta de dados foi realizada em duas etapas: na 1ª Etapa foi solicitada uma query ao Serviço de Arquivo Médico e Informações em Saúde do hospital para identificação dos pacientes; 2ª Etapa foi realizada a coleta das informações em prontuário eletrônico por meio de um instrumento elaborado no Microsoft Excel 2010. A análise dos dados foi feita no SPSS versão 18. **Resultados:** Observou-se que o tempo de internação foi de 18,74 ( $\pm 15,65$ ), idade de 57,83 ( $\pm 12,59$ ), sexo masculino (63%), maior % de pacientes com o 1º grau incompleto. O motivo de internação foi devido à complicações clínicas e realização de cirurgia, com 32,8%. 36,4% tinham HAS e 16,77, Diabete Mellitus, 34,5% dos pacientes foram considerados desnutridos e 24,1% eram tabagistas. 43% estavam restritos ao leito, 54,29% dos pacientes apresentaram ferida operatória e 16,67% úlcera por pressão. **Conclusão:** Foi possível caracterizar os pacientes do SECLIN diagnosticados com ITP quanto ao seu perfil clínico e sócio demográfico. Foi possível evidenciar acurácia diagnóstica, uma vez que os pacientes possuíam as características definidoras e alguns fatores relacionados propostos para o DE. Projeto foi aprovado pelo CEP HCPA (nº140073). **Palavra-chave:** Diagnóstico de Enfermagem; Cuidados de Enfermagem; Pele. Projeto 140073