

P 2957

Os discriminadores do sistema triagem de manchester estão associados aos diagnósticos de enfermagem?

Betina Franco, Lurdes Busin, Amália de Fátima Lucena, Ananda Ughini Bertoldo Pires
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Introdução: O Sistema de Triagem de Manchester (STM) está estruturado em fluxogramas e discriminadores, que representam a queixa principal do paciente, avaliada pelo enfermeiro por meio da coleta de dados focada, para estabelecer a prioridade de atendimento. Por outro lado, o enfermeiro também utiliza o Processo de Enfermagem (PE), para orientar o julgamento clínico e a tomada de decisão, estando dentre suas etapas a coleta de dados com vistas ao Diagnóstico de Enfermagem (DE). Assim, questiona-se, o STM pode subsidiar os DEs? **Objetivo:** analisar associações entre os discriminadores do STM e DEs segundo a NANDA International em pacientes adultos com prioridade clínica I e II. **Metodologia:** Estudo transversal desenvolvido na Emergência de um hospital universitário. Amostra de 219 pacientes, 66 com prioridade clínica I e 153 com prioridade clínica II. A coleta de dados foi realizada no prontuário em instrumento que contemplava fluxograma, discriminador e DEs. A análise estatística foi realizada pelo SPSS com teste exato de Fisher ou qui-quadrado e modelo de regressão de Poisson. O estudo foi aprovado pelo CEP (nº 140145). **Resultados:** Os discriminadores Dor precordial ou cardíaca e Dor intensa se associaram significativamente ao DE Dor aguda. Dor precordial ou cardíaca ainda associou-se ao DE Conforto prejudicado. Saturação O2 muito baixa e Respiração inadequada se associaram significativamente ao DE Padrão respiratório ineficaz, enquanto que Pulso anormal ao DE Débito cardíaco diminuído. Déficit neurológico agudo e Alteração súbita da consciência se associaram significativamente ao DE Negligência unilateral. Déficit neurológico agudo e Convulsionando se associaram ao DE Risco de perfusão tissular cerebral ineficaz. Convulsionando também se associou ao DE Risco de quedas e Hipoglicemia ao DE Risco de glicemia instável. **Conclusão:** Há associação significativa entre os discriminadores do STM e os DEs mais frequentemente utilizados na emergência, o que corrobora a hipótese de que o STM pode subsidiar o DE. **Palavras-chaves:** Enfermagem em emergência, triagem, diagnóstico de enfermagem. Projeto 140145