

P 4059

Perfil dos pacientes com tuberculose diagnosticados em hospital terciário de Porto Alegre

Raissa Velasques de Figueiredo, Alice Mânica Müller, Paulo de Tarso Roth Dalcin, Denise Rossato Silva
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Introdução: A tuberculose (TB) é uma infecção causada pelo *Mycobacterium tuberculosis* e é considerada um grave problema de saúde pública no mundo. A doença apresenta alta taxa de morbi-mortalidade, atinge principalmente grandes centros urbanos e tem maior prevalência na população em idade economicamente ativa e piores condições socioeconômicas. Apesar dos grandes esforços feitos para o controle da tuberculose na rede básica, o diagnóstico intra-hospitalar da TB ainda é grande. **Objetivo:** Analisar o perfil dos pacientes com tuberculose diagnosticados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). **Métodos:** Análise de dados sociodemográficos e clínico-epidemiológicos de pacientes com tuberculose diagnosticados no HCPA no período de março de 2013 a maio de 2015 através do prontuário eletrônico do hospital (AGH). **Resultados:** Foram incluídos 146 pacientes no banco de dados, destes 92 eram do sexo masculino (63%), 89 eram da raça branca (61%), 74 tinham ensino fundamental incompleto (50,7%) e 77 declararam renda familiar aproximada entre 1 e 3 salários mínimos mensais (52,7%). Quanto à comorbidades, 14 tinham história de tuberculose prévia (9,6%), 95 negaram contato prévio com tuberculose (65%), 53 eram tabagistas ativos (36,3%), 45 eram ex-tabagistas (30,8%) e 73 eram HIV positivos (50%), destes 14 tiveram diagnóstico do HIV realizado durante a internação (19,2%) e, dos pacientes que tinham diagnóstico prévio, 59 não usavam TARV ou usavam de maneira irregular (90%). Quanto a sintomas prévios à internação, 121 pacientes apresentaram perda de peso (83%), 109 febre (74,7%), 97 tosse (66,4%), 80 sudorese noturna (54,8%), 75 dispneia (51,4%), 63 expectoração (43,2%), 60 dor torácica (41,1%) e 22 apresentaram hemoptise (15,1%). **Conclusão:** Os pacientes com diagnóstico intra-hospitalar de tuberculose são em maioria homens, brancos, com baixa escolaridade e de baixa renda. Apresentam, também, alto índice de infecção pelo HIV com baixa adesão ao tratamento. Os sintomas mais frequentes ao diagnóstico foram perda de peso, febre, tosse e sudorese noturna. **Palavras chaves:** Tuberculose, epidemiologia, diagnóstico intra-hospitalar. Projeto 130192