

272 PREVALÊNCIA PRESUMÍVEL DA TOXOPLASMOSE CEREBRAL EM PACIENTES COM SIDA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA). Luciano Wolffebüttel, Marco V. Wainstein, Lisiane C. Ferreira, José F. Lubianca, Victor Petrillo e Matias Kronfeld. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

Com o objetivo de determinar a provável prevalência (por achados indiretos) da encefalite por toxoplasma (ET) em pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), e descrever o perfil sorológico antitoxoplasma desta população, foram revisados os prontuários de 313 pacientes internados no HCPA, com anticorpos séricos anti-VIH, no período de 1985 a 1989. A provável prevalência de ET foi 8,9% (28 casos). A dosagem de anticorpos da classe IgM foi sempre, no sangue e no líquido não reagente. Em 192 pacientes foi realizada a dosagem de anticorpos séricos, dos quais 126 (65,6%) foram reagentes para IgG. A sorologia líquórica, solicitada para 107 pacientes, foi reagente em 51 (47,7%) para IgG. Dos 27 pacientes com presumível ET e dosagem de anticorpos séricos antitoxoplasma, 26 foram reagentes para IgG. Dos 15 pacientes com presumível ET e dosagem de anticorpos antitoxoplasma no líquido, 14 foram reagentes para IgG. Concluímos que a prevalência da ET no nosso meio é semelhante à relatada na literatura e que maiores esforços devem ser empregados para o estabelecimento de um diagnóstico definitivo. (PROPESP)