

502 RECORRÊNCIA DE INFECÇÃO URINÁRIA EM LACTENTES. B.B. Lieskep K.Boianovsky, I.H.Goldraichp S.Jundi, c:A., Tedesco, N.P.Goldraich. Serviço de Pediatria/ NE-FROPED - HCPA.

Objetivando adequar o seguimento de lactentes com infecção urinária (IU), estabeleceu-se a probabilidade da primeira recorrência de IU, após o diagnóstico inicial, em pacientes com refluxo vesicoureteral (RVU) e/ou nefropatia do refluxo (NR) e com trato urinário normal. O diagnóstico de IU foi feito, com urina colhida por punção suprapúbica. O trato urinário foi investigado com ecogr a, cintilografia com DMSA e uretroc stografia miccional. A probabilidade de recorrência da IU foi calculada através de curva atuarial, tendo sido analisados separadamente os dados de lactentes com RVU e/ou NR e com trato urinário normal. Foram estudados 62 lactentes (23 meninos e 39 meninas). A idade, no momento do diagnóstico inicial, variou entre 1 e 23 meses. A média de acompanhamento foi de 16,7 meses (limites: 3 e 50 meses). RVU e/ou NR estavam presentes em 27 lactentes 35 tinham trato urinário normal. Houve ocorrência da IU em 20 lactentes (32%) nos primeiros 6 meses de seguimento. Não houve diferença estatisticamente significativa entre a recorrência de IU e a presença ou não de RVUP e/ou NR. Conclusão: há necessidade de acompanha ento rigoroso nos 6 meses após o dia3 nóstico, de lactentes com IU, com RVUP e/ou NR ou com tra to urinário normal. (PROPESP, CNPq, FAPERGS).