

TEMAS LIVRES - 21/05/2016

ENFERMAGEM - APRESENTAÇÃO MELHORES TEMAS LIVRES

44733

VASCOR-Score: estratificação de complicações vasculares baseada nos diagnósticos de enfermagem prioritário

ANGELITA PAGANIN, MARIUR GOMES BEGHETTO, THAMIRES DE SOUZA HILÁRIO, CAMILLE LACERDA CORREA, CATIA SOUZA PORTELA, DANIELA DE SOUZA BERNARDES, ROSELENE MATTE, ENEIDA REJANE RABELO DA SILVA e MARIAN PIZZA

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, BRASIL - Escola de Enfermagem UFRGS, Porto Alegre, RS, BRASIL - Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, BRASIL.

Fundamento: A adoção de escores, como o VASCOR-Score, recentemente validado, contribui na identificação de pacientes de maior risco para complicações após procedimentos diagnósticos e terapêuticos em Laboratórios de Hemodinâmica. **Objetivo:** Identificar a associação entre DE e complicações, entre VASCOR-Score > 3 e DE e entre VASCOR-Score > 3 e cuidados de enfermagem. **Materiais:** Pacientes que realizaram Intervenção Coronária Percutânea em um dos centros incluídos na coorte original (LH do HCPA, IC - FUC e Hospital Unimed de Caxias do Sul). **Métodos:** Coorte realizada entre outubro de 2012 e fevereiro de 2014 para derivação e validação de um escore de predição de risco de complicações vasculares pós-procedimento hemodinâmico denominado VASCOR-Score, gerando uma equação $VASCOR-Score = (Introductor > 6F \times 4,0) + (Procedimento Terapêutico \times 2,5) + (Complicação Hemodinâmica Vascular prévia \times 2,0) + (Uso \text{ prévio de Anticoagulantes orais} \times 2,0) + (Sexo Feminino \times 1,5) + (Idade \geq 60 \text{ anos} \times 1,5)$ e identificou-se que pacientes com VASCOR-Score ≥ 3 apresentavam maior risco de complicação (OR: 2,95; IC95%: 2,22-3,91). Foram empregados testes paramétricos e não paramétricos, de acordo com as características das variáveis (DE e intervenções) prescritas para todos os pacientes que foram avaliados a partir do VASCOR-Score. **Resultados:** Dos 122 pacientes, 93 (76,2%) apresentou VASCOR-Score > 3, 63 (51,6%) apresentava DE Integridade Tissular Prejudicada (Domínio 11, Classe 2, 00044, NANDA-International, 2015) e 67 (54,9%) possuíam estabelecido o diagnóstico Risco de Sangramento (Domínio 11, Classe 2, 00206, NANDA-International, 2015). Destes, 115 pacientes (94,2%) tiveram um ou mais cuidados relacionados prescritos (variação entre 1 e 10); os cuidados de enfermagem mais prescritos foram: monitorar sangramento (79,3%), evitar a flexão do membro (73%), comunicar formação de hematoma (63,1%), realizar curativo compressivo (40,2%), entre outros. Nos pacientes com DE Integridade Tissular Prejudicada houve mais complicações (P=0,03), não evidenciado nos pacientes com DE Risco de Sangramento (P=0,06). Ocorreu prescrição de mais cuidados para os pacientes com VASCOR-Score > 3 (P=0,042). **Conclusão:** Pacientes cujo escore VASCOR-Score indica risco para complicações tendem a receber mais prescrição de cuidados. Parece ser necessária a revisão dos DE, assim como dos cuidados relacionados, para pacientes submetidos a procedimentos em LH. VASCOR-Score pode guiar essa revisão.