

PREVALÊNCIA DE PSICOSE EM PACIENTES COM LÚPUS ERITEMTOSO SISTÊMICO (LES) DO SERVIÇO DE REUMATOLOGIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

ANDRÉA ABÊ PEREIRA; JOÃO CARLOS TAVARES BRENOL; TAMARA MUCENIC; MARIA GABRIELA LONGO; KELIN CRISTINE MARTIN; JULIANE VARGAS; MARÍLIA REINHEIMER; RENATA SCHULZ; AMANDA KLEIN DA SILVA PINTO

Introdução: O Lúpus Eritematoso Sistêmico é uma doença autoimune crônica e multissistêmica. Existem diversas manifestações neuropsiquiátricas, das quais, a psicose, juntamente com a convulsão, faz parte dos critérios diagnósticos da doença. Na literatura, a prevalência de psicose em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico varia entre 2,3 a 20%, ocorrendo no primeiro ano da doença em até 80% dos casos. **Objetivo:** Avaliar a prevalência de psicose na população de pacientes lúpicos acompanhados no serviço de Reumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. **Materiais e Métodos:** Foi realizado um estudo transversal com informações colhidas em um banco de dados de 376 pacientes acompanhados na internação e no ambulatório de LES do HCPA de dezembro de 2006 até fevereiro de 2009. **Resultados e Conclusões:** Dos 376 pacientes, 26 apresentaram psicose em algum momento após o diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico. A prevalência de psicose em pacientes lúpicos do serviço de Reumatologia do HCPA foi de 6,91%, não diferente da encontrada na literatura.