

REDUÇÃO DOS CUSTOS ATRAVÉS DO COMPARTILHAMENTO DE INFLIXIMABE ENTRE PACIENTES COM ARTRITE REUMATÓIDE: RESULTADOS APÓS 17 MESES DE ACOMPANHAMENTO EM CENTRO DE REFERÊNCIA

ANDRESSA CARDOSO DE AZEREDO; PENÉLOPE ESTHER PALOMINOS; ÂNGELA MASSIGNAN; ELISSANDRA MACHADO ARLINDO; LAURA CORSO CAVALHEIRO; LUCIA COSTA CABRAL FENDT; MIGUEL BONFITTO; PRISCILLA MARTINELLI; RENATA ROSA DE CARVALHO; CLAITON VIEGAS BRENOL; PAULO PICON; RICARDO MACHADO XAVIER; JOÃO CARLOS TAVARES BRENOL

Introdução: o uso de infliximabe (IFX) no tratamento da Artrite Reumatóide (AR) apresenta alto custo ao sistema público de saúde. O objetivo desse estudo foi avaliar a redução de custos através do compartilhamento de frascos de IFX entre os pacientes. **Materiais e métodos:** estudo prospectivo com 23 pacientes com AR que receberam pelo menos uma infusão de IFX entre agosto de 2007 e janeiro de 2009. IFX foi prescrito em dose de 3mg por kg nas semanas 0, 2, 6 e depois a cada 8 semanas. Pacientes eram avaliados através do DAS28, CDAI e HAQ. Caso o DAS28 permanecesse maior ou igual a 3,2, a dose de IFX era aumentada ou o intervalo entre as infusões era reduzido. As infusões eram realizadas em um mesmo horário, possibilitando o compartilhamento dos frascos. A medicação excedente de um paciente era usada para complementar a dose de outro paciente. O número de frascos usados foi comparado ao consumo teórico sem compartilhamento. **Resultados:** 91,3% dos pacientes eram mulheres, com uma média de 52,2 (dp 13,4) anos de idade e uma média de 12,6 (dp 6,5) anos de doença. A média de infusões por paciente foi de 6,8 (dp 3,2). Oito pacientes (34,8%) descontinuaram o tratamento e quatorze (60,8%) precisaram aumentar a dose ou reduzir o intervalo entre infusões. O intervalo médio de acompanhamento foi de 43,2 (dp 24,9) semanas. O valor médio do CDAI ao final do estudo (16,63 dp 12,33) em relação ao valor antes do uso de IFX (25,62 dp 13,29) foi significativamente menor (p de 0,16), mas o DAS28 e o HAQ não mostraram diferença significativa. No fim do estudo, 395 frascos foram usados dos 450 previstos e, após 17 meses, 120.422,00 reais foram economizados. **Conclusão:** o desenvolvimento de centros com compartilhamento de ampolas permite importante redução dos gastos com terapia com infliximabe.