

## Sessão 51 Odontologia D

435

**ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DAS RETENÇÕES DENTÁRIAS: DOR, EDEMA E TRISMO NO PÓS-OPERATÓRIO.** *Juliana da Silva Fink, Taís Weber Furlanetto de Azambuja, Francesca Bercini (orient.) (UFRGS).*

As intercorrências pós-operatórias da remoção cirúrgica de dente retido estão relacionadas com fatores predisponentes que variam desde a idade, sexo, indicações da exodontia, posição do dente, técnica cirúrgica, cuidados pós-operatórios, condições de higiene bucal, uso de contraceptivo oral bem como problemas de ordem médica e podem resultar em seqüelas inesperadas e indesejáveis de caráter temporário ou permanente. A dor, o edema e o trismo pós-operatórios, decorrentes da remoção cirúrgica de terceiros molares retidos, apresentam-se como conseqüências indesejáveis, porém são esperadas e, através de seu estudo podem ser minimizadas, melhorando a qualidade de vida do pós-operatório da remoção de terceiros molares. Temos por objetivo verificar quais os fatores (características pessoais e cirúrgicas) que estão relacionados a dor, ao edema e ao trismo no pós-operatório de pacientes submetidos à remoção cirúrgica de terceiros molares inferiores, em diferentes graus de retenção. A partir de pacientes encaminhados para o Ambulatório de Exodontia por indicação de outras disciplinas ou diretamente pelo Setor de Triagem da FO/UFRGS, com idade mínima de 18 anos e que não estejam sob quaisquer medicações sistêmicas ou apresentem histórias médicas positivas para quaisquer patologias, (critérios de exclusão) exceto o uso de contraceptivo via oral, com indicação precisa para remoção de terceiros molares inferiores retidos ou semi-erupcionados. (PIBIC).