

**HIDRADENITE SUPURATIVA E CARCINOMA EPIDERMÓIDE - RELATO DE CASO**

FELIPE HOMMERDING; DANIEL DE CARVALHO DAMIN; PAULO DE CARVALHO CONTU; CLAUDIO TARTA; RODRIGO GOMES BATISTA

Introdução: Paciente atendido no ambulatório da Coloproctologia com quadro de hidradenite supurativa perianal extensa com 2 anos de evolução e com lesão ulcerada central associada à lesões satélites. Objetivos: Apresentar um caso de associação de carcinoma epidermóide em hidradenite supurativa. Material e Métodos: Realizada ressecção da lesão em novembro de 2011. Anatomicopatológico mostrou hidradenite supurativa com carcinoma epidermóide. Ressecção de nódulo pulmonar com equipe da cirurgia torácica em dezembro de 2010, que mostrou ser adenocarcinoma de pulmão. Apresenta surgimento de lesão ulcerada em local de cicatrização de lesão perianal prévia, durante consultas de revisão, com biópsia indicando carcinoma epidermóide. Atualmente, paciente em avaliação pré-operatória para ressecção de recidiva tumoral. Resultados e conclusões: Hidradenite supurativa é infecção bacteriana que ocorre produzindo obstrução e ruptura das glândulas apócrinas. Os sintomas e sinais são de longa duração e caracterizam-se por presença de abscessos e fístulas recidivantes, que, após cessada a fase inflamatória, deixam como seqüelas áreas de fibrose, orifícios fistulosos e escassa secreção purulenta. A associação de hidradenite supurativa com carcinoma epidermóide é rara, mesmo nos casos de doença inflamatória de longa duração.