

MASTECTOMIA POUPADORA DA ARÉOLA E MAMILO (“NIPPLE-SPARING”) E RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA IMEDIATA: EXPERIÊNCIA RECENTE DO SERVIÇO DE MASTOLOGIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - BRASIL
CRISTIANE MONTANO ZAMBONI; RODRIGO CERICATTO; JORGE BIAZÚS; CARLOS MENKE; CHRISTIANE FALCÃO; ÂNGELA PARIZOTTO; JOSÉ ANTÔNIO CAVALHEIRO

I: A mastectomia nipple-sparing (MNS) preserva a pele da mama, incluindo o complexo aréolo-mamilar (CAM), é associada à reconstrução mamária imediata. A aplicação da MNS foi, no início, para fins profiláticos, e agora para o tratamento oncológico. O: Revisar os casos de MNS no HCPA e suas complicações. M: Revisão recente das MNS, no HCPA, entre março de 2005 e outubro de 2010. R: 81 MNS foram realizadas em 62 pacientes. Média da idade: 45 anos. Indicações: 20 casos de câncer invasor, 14 de carcinoma ductal in situ (CDIS), 4 de BRCA 1/2+ e 43 de redução de risco. Os procedimentos para reconstrução: 2 retalhos TRAM unilaterais, 38 reconstruções em etapa única com prótese e 41 reconstruções em duas etapas, com expansor de tecido, seguido por prótese. 3 casos de CDIS na base do CAM foram vistos na análise patológica, 1 no exame de congelação e 2 no exame de parafina, todas em pacientes com CDIS extenso. 36 pacientes realizaram biópsia de linfonodo sentinela, 5 tiveram linfonodo positivo, todas com diagnóstico de carcinoma ductal invasor. Pacientes fumantes, ou ex-fumantes, e submetidas à MNS, com reconstrução imediata com prótese, foram associadas às principais complicações: 3 casos de extrusão do implante, 1 necrose de CAM, 6 deiscência de sutura e 6 seromas. Um caso de carcinoma tubular, foi diagnosticado numa paciente submetida à MNS profilática. Não foram detectadas recorrências locais ou à distância durante o seguimento. Melhores resultados estéticos foram obtidos com reconstrução em duas etapas e com retalhos miocutâneos. C: Seleção criteriosa dos casos para MNS é recomendada. Aqui, o envolvimento tumoral da base do CAM esteve associado com CDIS extenso. As complicações ocorreram em pacientes com história de tabagismo e submetidas à reconstrução imediata com prótese.