

Introdução: A Trombose Venosa Profunda (TVP) e o Tromboembolismo Pulmonar (TEP) são dois componentes de um espectro de distúrbios hemostáticos, denominado Tromboembolismo Venoso (TEV). Devido aos achados clínicos pouco específicos e evolução insidiosa é difícil estabelecer uma incidência exata de TEV, fato esse correlacionado a sua grande morbimortalidade. Objetivos: O objetivo geral é determinar as características clínico-epidemiológicas dos casos de TEP e TVP na emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Os objetivos específicos são determinar fatores de risco relevantes; fatores prognósticos relevantes (hipoxemia, dilatação de ventrículo direito, hipotensão arterial e grau de hipertensão pulmonar); tempo decorrido entre início dos sintomas e diagnóstico, assim como o tempo decorrido entre o diagnóstico e o início do tratamento; e a prevalência de pacientes com TEV que progridem para TEP. Materiais e Métodos: Estudo transversal. Serão alocados os pacientes com diagnóstico confirmado de TEP e TVP atendidos no HCPA através da análise dos registros de atendimento no Serviço de Emergência e de baixa hospitalar. Os prontuários médicos desses pacientes serão revisados e os dados de relevância serão fatores de risco, apresentação clínica, métodos diagnósticos, manejo clínico e cirúrgico, desfecho clínico, complicações e recorrência em seis meses. Resultados: Ao final do estudo será traçado um perfil clínico e epidemiológicos dos pacientes com TVP e TEP atendidos no HCPA. Conclusão: A caracterização do perfil clínico e dos dados epidemiológicos da TVP e TEP ajudará a estabelecer de forma mais precisa seus diagnósticos e dessa forma diminuir a morbimortalidade relacionada, através de um manejo precoce adequado.