



EFEITOS DA DOENÇA DE PARKINSON NA COGNIÇÃO, ATENÇÃO E FUNÇÃO EXECUTIVA EM PACIENTES IDOSOS – DADOS PRELIMINARES

GIACOBBO BL¹; BORBA DL¹; WILD LB¹; ARGIMON LI¹; BALARDIN JB²; TARTARUGA L³; RIEDER CR⁴; BROMBERG E¹.




¹ Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, PUCRS, ² Universidade de São Paulo, USP. ³ Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. ⁴ Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Introdução: Além dos sintomas motores clássicos, a habilidade de planejar, organizar e outras funções executivas encontram-se deficientes em pacientes com doença de Parkinson (DP).

Objetivo: Elucidar em que grau as alterações atencionais e executivas comuns na DP podem afetar a utilização de uma estratégia de memorização incidental, buscando contribuir com subsídios para estudos voltados ao manejo e reabilitação destes pacientes.

Metodologia: Foram analisados idosos com DP (n=10; acima de 45 anos). Escores compatíveis com depressão severa (Inventário de Depressão de Beck), demência (Mini Exame do Estado Mental) e fases avançadas da DP (Escala Hoehn e Yahr) constituíram critérios de exclusão. Os pacientes realizaram testes de função executiva (categorias completadas na Classificação de Cartas de Wisconsin), atenção (Stroop, parte C) e memória (Reconhecimento de Objeto e Contexto com estratégia de codificação associativa). Os dados (média \pm desvio padrão) foram submetidos à regressão linear, considerando $p < 0,05$ estatisticamente significativo.

Resultados e Discussão: A análise de regressão entre o desempenho na tarefa de memória contextual ($67,287 \pm 23,462$) e os escores obtidos no teste de função executiva ($1 \pm 0,66$) não foi significativa ($p=0,808$). Entretanto, os escores obtidos no teste de atenção ($20,5 \pm 5,563$) mostraram uma relação significativa ($p=0,041$; $B=2,755$) com o desempenho na tarefa da memória contextual.



Os resultados indicam que os recursos atencionais são importantes preditores do desempenho dos pacientes com DP na tarefa de memória contextual e utilização da estratégia de codificação incidental fornecida. Portanto, as disfunções de atenção características da DP devem ser consideradas na elaboração de estratégias adequadas de manejo e reabilitação cognitiva.