

Orientação para a atenção primária à saúde de serviços utilizados por pessoas idosas de Porto Alegre, RS.

Introdução: A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, de 2006, define que a atenção à saúde dessa população terá como porta de entrada a Atenção Primária à Saúde (APS), que é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos atributos de primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado. Desta forma, aumenta a necessidade de avaliar as respostas que o sistema de saúde vem dando as questões relacionadas com a saúde da pessoa idosa e a capacidade que o mesmo possui de orientar sua atenção considerando os atributos essenciais à sua qualidade. Objetivo: Descrever a orientação dos serviços acessados pelos idosos, de acordo com o escore correspondente a soma dos atributos essenciais da atenção primária a saúde através do instrumento PCATool-Brasil (Instrumento de Avaliação da APS). Método: Neste estudo de delineamento transversal, foram entrevistados 804 idosos, selecionados através de uma amostra aleatória por conglomerados nos distritos sanitários Partenon e Lomba do Pinheiro em Porto Alegre. Foram realizadas entrevistas por meio de um questionário sociodemográfico, além do instrumento PCATool-Brasil. Foi realizada análise descritiva das variáveis e dos escores essenciais dos atributos de APS. Serviços de saúde com escores maiores ou iguais a 6,6 foram considerados fortemente orientados para a APS. Resultados: Dos 804 idosos contatados, 784 foram incluídos nesta análise, destes: 526 (67,1%) eram mulheres, 258 eram homens (32,9%), a média de idade foi de 69,7 ( $\pm 7,3$ ) anos e a média de anos de estudo foi de 6,0 ( $\pm 3,8$ ). Referiram acessar serviço de atenção primária à saúde, 116 (45,8%) homens e 263 (50,1%) mulheres. O escore médio do PCATool para os homens foi de 5,47 ( $\pm 1,3$ ), e para as mulheres foi de 5,64 ( $\pm 1,1$ ), 18,6% dos serviços acessados por homens e 20,0% dos serviços acessados por mulheres tiveram orientação para APS. Conclusão: A média dos escores do PCATool de todos os serviços de saúde foi inferior ao valor que indica forte orientação à APS, e poucos serviços acessados pelos idosos apresentaram escore superior ao mínimo, sugerindo que há uma necessidade de fortalecimento da APS, por meio de operações em seus atributos.