

009

DIVERSIDADE DE CARABIDAE (COLEOPTERA) NO PARQUE COPESUL, TRIUNFO, RS.
Rodrigo Milton Moraes, Maria Helena Galileo (orient.) (JB-FZB/RS).

Em Coleoptera, a família Carabidae insere-se na subordem Adephaga. São besouros típicos de solo, geralmente encontrados em terrenos arenosos, sob pedras e folhiço, alguns habitam ambientes úmidos e ripários, bem como associados às árvores e arbustos. O objetivo deste trabalho é identificar os carabídeos coletados no Parque Copesul, fornecer breves considerações a respeito de sua história natural. O material estudado é proveniente dos anos de coleta no Parque Copesul de Proteção Ambiental (Parque Copesul, em Triunfo, RS) iniciado em 1987. A captura dos exemplares, ao longo dos anos, deu-se por métodos ativos e passivos de coletas. Foram registrados 360 indivíduos, agrupados em duas subfamílias, 14 tribos e 45 espécies/ morfoespécies, os táxons identificados são: Brachininae, Brachinini, *Pheropsophus aequinoctialis* (Linné, 1763); Carabinae, Carabini, *Calosoma* spp.; Morionini, *Morion* sp.; Ctenodactylini, *Leptotrachelus* sp.; Pentagonicini, *Pentagonica* sp.; Agriini, *Agra* spp.; Harpalini *Notiobia* spp.; Masoreini, *Aephnidius* sp.; Lebiini, *Lebia (loxopeza)* sp., *Lia nigropicta* (Chaudoir, 1871), *Lebia* sp., *Callida metallica* Dejean, 1825, *Callida amethystina* (Fabricius, 1787); Pterostichini, *Tichonilla festiva* (Tschitscherine, 1898); Galeritini, *Galerita melanarthra* (Chaudoir, 1869); Odacanthini, *Colliuris* sp.; Scaritini, *Scarites* sp., *Clivina* sp., *Dyschirius* sp., o único exemplar de Bembidiini não foi identificado. O material das últimas coletas com a armadilha de solo ainda está sendo estudado e, provavelmente, refletem indivíduos previamente amostrados. (PIBIC).