
REVISTA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE E
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

REVISTA HCPA 2005; 25 (Supl 1) :1-251



^a
Semana Científica
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
12º Congresso de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Mercosul

Anais

REVISTA HCPA - Volume 25 (Supl 1) - Setembro 2005
International Standard Serial Numbering (ISSN) 0101-5575
Registrada no Cartório do Registro Especial de Porto Alegre sob nº 195 no livro B, n.2
Indexada no LILACS

A Correspondência deve ser encaminhada para: Editor da Revista HCPA - Largo Eduardo Zaccaro Faraco - Rua Ramiro Barcelos, 2350
90035-903 - Porto Alegre, RS - Tel: +55-51-2101.8304 - www.hcpa.ufrgs.br

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE PACIENTES COM HIDROPSIA ENDOLINFÁTICA (SÍNDROME DE MÉNIÈRE) NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDNA MACEDO; JOEL LAVINSKY; LETÍCIA ROSSI BUENO; CÍNTIA D'ÁVILA; ANNE-ROSE L. W. BAÚ; MICHELLE LAVINSKY WOLFF; LUIZ LAVINSKY

Introdução: A doença de Ménière é assim denominada quando de etiologia idiopática. Os pacientes que desenvolvem a sintomatologia clássica e têm etiologia definida apresentam a Síndrome de Ménière. Entre as principais etiologias da Síndrome de Ménière estão: alergia, sífilis, otite média crônica, otosclerose, distúrbio no metabolismo dos carboidratos e lipídios, trauma físico e acústico, auto-imunidade, hipotireoidismo, enxaqueca, leucemia, estresse, doenças genéticas e psiquiátricas (principalmente, depressão e ansiedade). **Objetivo:** Descrever o resultado da busca etiológica para a Doença de Ménière nos pacientes atendidos em ambulatório específico no HCPA. **Pacientes e Métodos:** Todos os pacientes atendidos em Ambulatório de Doença de Ménière do HCPA são submetidos a um protocolo padronizado de busca etiológica para a síndrome incluindo anamnese específica, exames audiovestibulares, laboratoriais e de imagem. Noventa e quatro pacientes com Doença de Ménière foram atendidos no ambulatório em estudo até Julho de 2005, tendo sido identificada etiologia provável para a síndrome em 60 pacientes (63,8%). **Resultados e Conclusões:** As doenças de base mais prevalentes foram: distúrbio no metabolismo dos carboidratos, presente em 58 do grupo de 66 pacientes que tiveram análise de curva glicêmica e insulinêmica (88% deste grupo); Diabete Melito tipo 2, presente em 10 pacientes (10,6%); hipotireoidismo em 8 (8,5%); doenças psiquiátricas em 15 (16%); enxaqueca em 4 (4,2%); otite média crônica em 6 (6,3%); e por doenças auto-imunes em 12 (12,7%). Em 9 pacientes (9,5%) existe mais de uma provável etiologia. A definição etiológica da Doença de Ménière é um elemento de grande valor no manejo desses pacientes. Os pacientes do grupo estudado apresentam prevalência elevada de distúrbio metabólico dos carboidratos como patologia de base para a Doença de Ménière.