

---

REVISTA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE E  
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

---

REVISTA HCPA 2005; 25 (Supl 1) :1-251



*a*  
Semana Científica  
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre  
12º Congresso de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Mercosul

---

# Anais

REVISTA HCPA - Volume 25 (Supl 1) - Setembro 2005  
International Standard Serial Numbering (ISSN) 0101-5575  
Registrada no Cartório do Registro Especial de Porto Alegre sob nº 195 no livro B, n.2  
Indexada no LILACS

A Correspondência deve ser encaminhada para: Editor da Revista HCPA - Largo Eduardo Zaccaro Faraco - Rua Ramiro Barcelos, 2350  
90035-903 - Porto Alegre, RS - Tel: +55-51-2101.8304 - [www.hcpa.ufrgs.br](http://www.hcpa.ufrgs.br)

## AVALIAÇÃO SÓCIO-COMPORTAMENTAL DE CRIANÇAS PORTADORAS DE DERMATITE ATÓPICA

PAULO DE TARSO DA LUZ FONTES NETO; MAGDA BLESSMANN WEBER; NICOLLE GOLLO MAZOTTI; BRUNA BARZENSKI; GABRIELA FORTES ESCOBAR; SUZANA FORTES; TANIA FERREIRA CESTARI

**Introdução:** a dermatite atópica (DA) é uma doença inflamatória crônica da pele que apresenta um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes. Considerando estudos recentes que descrevem a associação entre aspectos psicológicos e DA, acredita-se que a investigação da existência de um possível perfil comportamental dos pacientes possa auxiliar o desenvolvimento de intervenções psicoterápicas específicas e aumentar o conhecimento sobre a doença. **Método:** estudo caso-controle para avaliação do perfil sócio-comportamental de crianças portadoras de DA, entre 4 e 18 anos de idade. O grupo estudo incluiu pacientes com DA do ambulatório do HCPA, e o grupo controle crianças e adolescentes matriculados em escola da rede pública de Porto Alegre, sem doença dermatológica. A coleta dos dados realizou-se através do CBCL (Child Behavior Checklist), validado no Brasil com o nome de Inventário de Comportamento da Infância e Adolescência. **Resultados:** Foram selecionados 50 pacientes, 25 em cada grupo. Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nas duas dimensões globais (internalização ( $p < 0,001$ ) e externalização ( $p < 0,002$ )), sendo que as crianças portadoras de DA mostraram sintomas relacionados com ansiedade/depressão ( $p < 0,002$ ), alterações de pensamento ( $p = 0,019$ ) e comportamento agressivo ( $p < 0,001$ ) quando comparadas com crianças sem a doença. **Conclusão:** estes resultados demonstram que as crianças portadoras de DA apresentam-se menos competentes socialmente, com mais problemas de comportamento e sintomas relacionados com ansiedade/depressão, insegurança, teimosia e agressividade, comparadas com crianças sem a doença. Destacamos a necessidade de abordagens interdisciplinares no tratamento dos atópicos, valorizando não só o aspecto dermatológico, como também os aspectos emocionais dos indivíduos.