

PREVALÊNCIA DE PACIENTES COM ZUMBIDO E AUDIOMETRIA NORMAL ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO DE ZUMBIDO DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Karine Bombardelli, Talita Lopes Silva, Konrado Massing Deutsch, Alice Lang Silva, Daiana Eltz Martins, Celso Dall Igna, Leticia Petersen Schmidt Rosito

Introdução: o zumbido constitui-se um problema de saúde prevalente (15%) e associa-se, em sua maioria, a perdas auditivas. Pacientes com zumbido e audiometria normal constituem um grupo importante, pois, além de seus achados não sofrerem influência da perda auditiva, estudos sugerem ser o zumbido uma manifestação inicial de disfunção auditiva. Objetivos: avaliar a prevalência de pacientes com exames audiológicos normais dentre os pacientes com queixa de zumbido atendidos no Ambulatório de Zumbido do HCPA, no período de setembro de 2002 a janeiro de 2012. Materiais e Métodos: Estudo transversal com 407 pacientes atendidos no Ambulatório de Zumbido do HCPA no período de setembro de 2002 a janeiro de 2012. Os procedimentos realizados foram anamnese com protocolo sistematizado, exame otorrinolaringológico completo e audiometria tonal e vocal. Considerou-se com audiometria normais aqueles com limiares e SRT maiores ou iguais a 25dB em todas as frequências. Resultados e Conclusões: a prevalência de pacientes com zumbido e audiometria normal na amostra foi de 8,35%. Assim, percebemos que dentre os pacientes avaliados, todos com queixa de zumbido, prepondera a presença de alterações na audiometria.