

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PUNÇÕES DE TIREÓIDE REALIZADAS POR MÉDICOS RESIDENTES E CONTRATADOS DE UM HOSPITAL DO SUL DO BRASIL

Régis Augusto Reis Trindade, Lillian Gonçalves Campos, Angela Faistauer, Mauricio Farenzena, Fábio Bonalume, Eliza Porciuncula Justo, Antonio Carlos Maciel

INTRODUÇÃO: Segundo a literatura, nódulos de tireóide são comuns e, na maioria das vezes, de etiologia benigna. A avaliação desses nódulos requer o emprego da Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) para o seu diagnóstico etiológico, sendo um procedimento realizado de forma simples e com baixo custo. Entretanto, o sucesso deste método depende da experiência do patologista e do médico que o realiza. **OBJETIVOS:** Relatar a taxa de amostras satisfatórias ou não de PAAF de nódulos de tireóide e comparar o percentual de amostras insatisfatórias entre os médicos radiologistas contratados e os médicos residentes do Serviço de Radiologia de um hospital de nível terciário do sul do Brasil. **MATERIAL E MÉTODOS:** Neste trabalho, foram utilizados os laudos citopatológicos da PAAF de indivíduos com nódulo de tireóide que realizaram este procedimento durante os meses de janeiro a março de 2012. Os laudos evidenciavam o tipo de amostra (se satisfatória ou não) e, a partir disso, compararam-se os resultados entre os Médicos Residentes e os Contratados do Serviço. Foram analisados os resultados de 56 punções. **RESULTADOS E CONCLUSÕES:** Nos exames citopatológicos, a taxa de amostras satisfatórias foi de 32 (57,1%). Os residentes realizaram 27 (48,2%) das punções apresentando 11 (40,7%) de amostras insatisfatórias. Os médicos contratados realizaram 29 (51,7%) das 56 PAAF realizadas com 13 (44,8%) de amostras insatisfatórias. Não ocorreu nenhuma complicação decorrente do procedimento neste período. Observou-se taxa semelhante de amostras satisfatórias entre os médicos contratados e residentes. Faz-se necessário um estudo maior com maior número de indivíduos para uma melhor análise dos resultados.