

RELATO DE CASO: CISTITE INTERSTICIAL EM PACIENTE SIDA COM FASE INICIAL DE PARAPARESIA TROPICAL ESPÁSTICA E NEFROPATIA PELO HIV. Faulhaber GAM , Stifft J , Seligman R . Serviço de Medicina Interna . HCPA - UFRGS.

Paciente feminina de 44 anos com diagnóstico de HIV há 2 anos interna por dor supra-pública intensa acompanhada de incontinência urinária. Ecografia mostra bexiga de paredes espessadas, irregulares, com moderada hidronefrose bilateral. Uroculturas negativas. Cistoscopia mostra bexiga com áreas erosadas, volume reduzido, com contrações não-inibidas. Biópsia das lesões erosadas compatíveis com cistite intersticial. Paciente apresenta sorologia para HTLV-1 positiva e evolui com pirimidialismo progressivo com discreta paresia de membros inferiores. A Cistite intersticial é uma patologia rara, acomete predominantemente mulheres, apresentando clínica de dor com enchimento vesical, aliviado com micção, acompanhado de urgência urinária, capacidade vesical menor que 350ml e lesões erosadas na bexiga. Não há relato na literatura da associação de Cistite intersticial e Paraparesia Tropical Espástica.