

098

AVALIAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA APÓS REMOÇÃO INCOMPLETA DE DENTINA CARIADA. Rafael Bianchi^a, Elenara F. Oliveira^b, Vânia R. Fontanella^c, Marisa Maltz^a (Departamentos de Odontologia Preventiva e Social^a e Cirurgia e Ortopedia^c, FO-UFRGS e Departamento de Odontologia Preventiva e Social, FO-UFPEL^b)

O objetivo do trabalho é estudar "in vivo" o desempenho de restaurações de resina após a remoção incompleta de dentina cariada. Restaurações de resina (Charisma[®]) classe I e II foram confeccionadas em 30 dentes permanentes posteriores. As avaliações clínica e radiográfica foram realizadas no início do estudo e após 9-10 meses. Os critérios utilizados na avaliação clínica foram os propostos por RYGE (1980) com a associação de corante (OHKUBO et al., 1982): (A) sem penetração do corante e contorno contínuo; (B) penetração do corante, mas não do explorador; (C) penetração do corante e evidência de fissuras ao longo da margem; (D) fratura da restauração. A avaliação radiográfica está sendo realizada através de radiografias interproximais padronizadas com a utilização de posicionadores individuais. Para a análise radiográfica será utilizado o método visual e o método de subtração digital da imagem radiográfica (Imagelab[®]). Em nenhum caso houve relato de sintomatologia dolorosa durante o período experimental. A análise clínica de 17 dentes revelou que 2 foram classificados com o código A, 14 com B e 1 com C. O exame visual das radiografias não indicou aumento das zonas radiolúcidas. Os achados clínicos e radiográficos sugerem que não houve progressão de lesão de cárie e instalação de cárie secundária.