

253

**ESTUDO DE VALIDADE DA ESCALA DE IDEAÇÃO SUICIDA DE BECK (BSI) EM ADOLESCENTES.** *Priscila de J. Beckel, Vivian R. Borges, Blanca G. Werlang* (Faculdade de Psicologia, Programa de Pós Graduação em Psicologia, PUCRS)

Estudos epidemiológicos têm revelado um aumento na incidência de suicídio no período da adolescência. A ideação suicida é considerada um indício importante em relação à possibilidade de que a intenção letal chegue a se concretizar subsequentemente. A Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) foi desenvolvida originalmente nos Estados Unidos com a finalidade de triagem de ideação suicida. A avaliação da utilidade clínica da BSI, na sua versão brasileira já foi testada em amostras clínicas e em universitários, apresentando resultados satisfatórios de fidedignidade e validade. Com adolescentes, constatou-se que, em termos de fidedignidade apresenta coeficiente com significância estatística ( $\alpha=0.98$   $p<0.001$ ). Com a finalidade de identificar a validade do construto ideação suicida, o objetivo desse estudo foi identificar quais os principais fatores associados (solução fatorial) à BSI em adolescentes com idades entre 15 e 19 anos. A amostra foi selecionada por conveniência a partir de uma população de adolescentes que frequentam instituições escolares públicas e privadas, de ambos os sexos, num total de 121 sujeitos. Os dados foram analisados de acordo com procedimento estatístico SPSS. Através da análise fatorial foi possível extrair 2 fatores com raiz característica superior a 1. O fator 1 engloba os itens 1,2,4,7,12,15 e 16. Trata-se de uma dimensão que pode significar a intensidade da motivação para o suicídio. O fator 2 inclui os itens 5,8,11 e 19, apresentando uma temática que pode ser interpretada como desejo ativo para suicídio. Esses dois fatores são uma combinação linear dos itens da escala em estudo, os quais explicam 74,79% da variância total. Desta forma, são os fatores que mais influenciam na variabilidade dos resultados. A distribuição dos fatores comprova a validade da BSI como recurso útil na avaliação da ideação suicida em adolescentes normais.