



Evento	Salão UFRGS 2013: SIC - XXV SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2013
Local	Porto Alegre - RS
Título	Consumo de creme dental durante tratamento periodontal e manutenção periódica preventiva (MPP)
Autor	LUIZA GASPAROTTO CRESCENTE
Orientador	SABRINA CARVALHO GOMES

O consumo de produtos de higiene bucal é frequente na população brasileira, como mostrado em alguns estudos. Pouco se sabe, no entanto, como se dá este consumo, em termos quantitativos, no dia-a-dia de sujeitos sob tratamento periodontal. Terapias periodontais que visem à educação para a saúde bucal têm, inerente, o reforço das práticas de higiene bucal como seu principal alicerce.

No presente ensaio clínico, os sujeitos em tratamento receberam atenção em três momentos distintos: T1: primeiro momento experimental, com ênfase no tratamento da gengivite (1 mês); T2: segundo momento experimental, com ênfase no tratamento da periodontite (1 mês); T3: exame final, um mês após o término do tratamento periodontal subgingival (T2). Todos os participantes receberam o mesmo creme dental (Colgate® Máxima Proteção Anticáries, 90 g). Após cada etapa, estas bisnagas de dentifrício foram recolhidas, identificadas com o código do paciente e momento experimental ao qual pertenciam, e armazenadas em local próprio. As bisnagas devolvidas pelos participantes foram, então, pesadas, e o consumo reportado em gramas para T1, T2 e T3. Análise de intenção de tratar foi utilizada. Estas medidas foram avaliadas por meio de SPSS (18.0), por teste t de *student* para medidas repetidas.

Pode-se observar que o consumo de creme dental entre T1 e T2 foi semelhante ($45,8 \pm 21,3$ e $45,1 \pm 20,9$). No entanto, o consumo entre T2 e T3 mostrou diferenças, T3 sendo estatisticamente maior ($59,9 \pm 20,7$) que o observado em T2. Esta análise preliminar sugere que a ausência de um acompanhamento profissional possa influenciar no aumento do consumo de creme dental, tendo em vista que em T3 os participantes não foram acompanhados semanalmente. No entanto, análises conclusivas só poderão ser realizadas após a inclusão de um maior número de participantes e a partir da análise do consumo em tempos experimentais mais longos (fase de manutenção periódica preventiva).