



REVISTA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE E
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

REVISTA HCPA 2003; 23 (Supl.)

23^a SEMANA CIENTÍFICA do HCPA

De 01 a 05 de Setembro de 2003

10º Congresso de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Mercosul

Anais

CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS E HISTOLÓGICAS DAS NEOPLASIAS COLORRETAIS. Alves LB , Rosa AS , Zanatto VC , Contu P , Rosito MA , Moreira LF . Programa de pós-Graduação em Cirurgia . HCPA - UFRGS.

INTRODUÇÃO O câncer colorretal é o segundo em incidência e mortes por câncer. A distribuição deste tipo de tumor é semelhante entre homens e mulheres. O câncer em cólon direito é mais comum em mulheres, e o câncer em reto é mais comum em homens. A localização é de aproximadamente 50% em retossigmoide, 30 a 40% em reto, 25% em ceco e cólon ascendente. Está havendo uma mudança gradual de distribuição do reto e cólon esquerdo para o cólon direito. Em relação à classificação histológica, 90 a 95 % dos tumores malignos do intestino grosso são adenocarcinomas. Carcinomas bem diferenciados tem melhor prognóstico. OBJETIVO Analisar as características anatômicas, histológicas e estadiamento das neoplasias colorretais no Serviço de Proctologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. MÉTODOS Estudo transversal. Foram analisados 74 pacientes submetidos à ressecção cirúrgica de câncer colorretal ou lesões com alta suspeita clínica de malignidade entre setembro de 2001 e junho de 2003. Revisão dos exames de imagem, da localização tumoral e do exame anatomopatológico da peça

cirúrgica. RESULTADOS Aproximadamente 70% dos tumores localizaram-se no cólon esquerdo, sendo 55% no reto. As mulheres representaram 77% dos casos de tumores no cólon direito e 54% do cólon esquerdo. Em relação ao estadiamento, 14, 19, 26, 33 e 8% eram adenomas, Duckes A, B, C ou D respectivamente. O tipo histológico mais freqüente foi o adenocarcinoma representando 84% dos casos. Os tumores bem diferenciados representaram 7% da amostra, enquanto os moderadamente e os pouco/indiferenciados foram encontrados em 74 e 19% dos casos, respectivamente. CONCLUSÃO Há grande incidência de localização tumoral em reto, 53 % na nossa amostra, dado este, concordante com o encontrado na literatura. Encontramos uma tendência a apresentação em cólon direito mais em mulheres. Localização em reto semelhante em homens e mulheres. Em nossa amostra, 45 % dos pacientes foram operados em estágio localizado, enquanto na literatura estes pacientes perfazem apenas 37%. Pior prognóstico dos pacientes em estágios mais avançados. Frente a estes fatos, faz-se necessário um incremento no rastreamento e diagnóstico precoce do câncer colorretal.