

ESTUDO TAXONÔMICO DO QUITOCO (PLUCHEA CASS.-ASTERACEAE) NO RIO GRANDE DO SUL. *Silvane Dalpiaz, Mara Rejane Ritter* (Departamento de Botânica, Instituto de Biociências, UFRGS).

O gênero Pluchea pertence a tribo Inuleae e a família Asteraceae (Compositae), apresentando cerca de 80 espécies descritas. Encontra-se amplamente distribuído nas regiões temperadas, tropicais e subtropicais. Para o Sul do Brasil são citadas 3 espécies: Pluchea laxiflora HOOK. et ARN., P. oblongifolia DC. e P. sagittalis (LAM.) CABR. Na medicina popular do RS a espécie utilizada é P. sagittalis (LAM.) CABR., conhecida com quitoco, arnica, yerba de lucero e lusero. É empregada para problemas digestivos, como tônico amargo, na preparação de bebidas alcoólicas e em contusões. Os autores pretendem estabelecer padrões e caracteres diferenciais básicos para identificação das espécies encontradas no RS. O material coletado está sendo examinado e comparado com material catalogado de vários herbários do Estado. Até o momento foram confirmadas as três espécies de Pluchea citadas para o RS. (PET/CAPES/BIOLOGIA PUCRS).