

AVALIAÇÃO DA MEMÓRIA DE PACIENTES COM TRANSTORNO BIPOLAR COMPARADA COM SUJEITOS NORMAIS

VERA BEATRIZ DELGADO DOS SANTOS; MÁRCIA LORENA FAGUNDES CHAVES

Introdução: Este trabalho teve como propósito estudar pacientes em fase maníaca, cujos principais sintomas são afeto eufórico, autoestima elevada, grandiosidade, insônia, fuga de idéias e envolvimento excessivo em atividades, em comparação a sujeitos normais. O estudo foi realizado na unidade de internação psiquiátrica de um hospital geral. **Objetivo:** Comparar o desempenho de memória em tarefas com e sem conteúdo afetivo de pacientes em fase maníaca e de sujeitos-controle. **Metodologia:** Estudo transversal no qual foram estudados 24 pacientes em fase maníaca e 25 sujeitos normais com idade média de 36,83 e 39,32 anos respectivamente. O diagnóstico foi estabelecido de acordo com os critérios do DSM-IV e, para avaliar a intensidade dos sintomas, usou-se a escala de Young. Critérios de exclusão: déficit cognitivo grave, abuso de substâncias legais ou ilegais, analfabetismo, maiores de 59 anos e menores de 20 anos. Os testes utilizados neste estudo foram spam de palavras positivas, neutras, negativas e reconhecimento de imagens com conteúdo afetivo. **Resultados:** No teste de reconhecimento de imagens neutras e spam de palavras positivas, o grupo de pacientes em fase maníaca apresentou um escore mais baixo comparado com o grupo de sujeitos normais. **Conclusão:** Os resultados do estudo mostram que pacientes com transtorno bipolar apresentam déficits de memória verbal e atenção sustentada.