

Sminov, ANOVA e análise de sobrevivência por Kaplan-Meier. Observamos o aumento dos níveis de autofagia em CEC ($p < 0,001$) em relação aos outros grupos, porém sem associação com a evolução e sobrevivência desses pacientes. Entre as leucoplasias, observamos maior percentual de células positivas na camada intermediária de leucoplasias displásicas ($p = 0,0319$) e na camada basal de lesões com pior evolução ($p = 0,0133$). Conclui-se até o momento que há os níveis de autofagia aumentam significativamente durante o processo de carcinogênese bucal da mucosa normal até carcinomas invasivos e estão correlacionados com o risco de transformação maligna de leucoplasias. Palavras-chaves: autofagia, carcinoma espinocelular, leucoplasia

eP1447

Saúde bucal de cuidadores de indivíduos com deficiência intelectual: perfil sociodemográfico e autopercepção

Bruna Ackermann Schardong, Júlia Bauer Marques, Camila Oliveira da Costa, Willian Konflanz, Lina Naomi Hashizume - UFRGS

A sobrecarga é um fator que influencia diretamente a qualidade de vida de quem cuida do indivíduo com deficiência intelectual. O objetivo do estudo foi analisar o perfil sociodemográfico e avaliar a autopercepção de saúde bucal de cuidadores desses indivíduos. Foram entrevistados 104 cuidadores em instituições de apoio à pessoa com deficiência intelectual da região metropolitana de Porto Alegre (RS), para que se avaliassem as variáveis estudadas. A maior parte era composta por mulheres (93%) e mães (79%), na faixa etária de 31-45 anos (35%), com ensino fundamental completo (49%). Quanto à renda familiar, o próprio cuidador era o provedor (40%), seguido pelo seu cônjuge (36%), com renda total até 2 salários mínimos (65%). Em relação à percepção de sua saúde bucal, 35% responderam que estavam insatisfeitos com seus dentes, 18% deles relataram já ter tido dor de dente ao se alimentar nos últimos 6 meses. 45% dos entrevistados relatam não terem procurado atendimento odontológico por dificuldades financeiras, sendo que 41% foi à sua última consulta odontológica a mais de um ano. A maioria (45%) relatou ter procurado o dentista para extração ou tratamento. Ao se relacionar a saúde bucal do indivíduo sob cuidados e a do cuidador, 75% desses afirmam que a saúde daqueles é mais importante do que a sua, embora 47% acreditem que cuidar de uma pessoa com deficiência acarreta deixar a sua em segundo plano. Conclui-se que o perfil dos cuidadores de indivíduos com deficiência intelectual entrevistados no presente estudo eram de mães cuidadoras em tempo integral, com poucos recursos financeiros e baixa escolaridade. Muitas percebiam a necessidade de tratamento odontológico, entretanto, priorizavam o indivíduo sob cuidados em detrimento da sua saúde bucal, buscando atendimento odontológico apenas em situação extrema. Palavras-chaves: cuidadores, deficiência intelectual, saúde bucal

eP1465

Avaliação da proliferação e imortalização celulares em leucoplasias bucais

Isadora Peres Klein, Manoel Sant'Ana Filho, Luise Meurer, Manoela Domingues Martins, Vinicius Coelho Carrard - UFRGS

A Leucoplasia bucal - LB é definida como uma placa ou mancha predominantemente branca que não pode ser classificada clinicamente ou patologicamente como qualquer outra doença que apresenta risco de transformação maligna. O objetivo deste estudo foi avaliar taxa proliferativa e imortalização celulares em LB a partir da imunomarcagem de Ki-67 e de BMI-1. Foram selecionados casos de mucosa bucal clinicamente normal - MN ($n = 9$), hiperplasia inflamatória ($n = 17$), LB ($n = 61$) e de carcinoma espinocelular - CEC ($n = 19$). Os cortes histológicos foram submetidos à técnica imunohistoquímica para marcação do Ki-67 e do BMI-1. Para a quantificação foi considerado o percentual de células positivas por 1000 células para o CEC e 1500 células para os demais grupos. O percentual de imunomarcagem de Ki-67 e de BMI-1 foi mais alto no CEC quando comparado aos demais grupos e na LB quando comparada à MN (Kruskal-Wallis, $p < 0,05$). Houve correlação positiva entre imunomarcagem de Ki-67 e BMI-1 (Correlação de Spearman, $R = 0,36$, $p < 0,05$). O percentual médio de imunomarcagem de Ki-67 na camada parabasal do epitélio foi mais alto (Teste t de Student, $p < 0,05$) em LB maiores do que 2 cm ($44,82 \pm 16,10$) quando comparadas com LB menores do que 2 cm ($36,08 \pm 12,75$). Conclui-se que a proliferação e a imortalização celulares são eventos relacionados e que se acentuam nos estágios mais tardios da progressão tumoral. Palavras-chaves: leucoplasia bucal, prognóstico, carcinoma espinocelular.

eP1472

Comparação de diferentes abordagens - incisões - no pós-operatório de cirurgia de terceiro molar retido

Táise Simonetti, Adriana Corsetti - UFRGS

Segundo Edela Puricelli (2014), a retenção dentária é um estado de patogenicidade que acomete dentes decíduos, permanentes e supranumerários. As complicações associadas à retenção dentária podem ser de natureza mecânica, neurológica, infecciosa ou tumoral e, por isso, realiza-se a remoção cirúrgica de terceiros molares retidos. De acordo com Rosa et. al (2002), a avaliação periodontal após a remoção cirúrgica de terceiros molares inferiores impactados tem levantado questões sobre o resultado direto desta cirurgia na subsequente formação de bolsa periodontal, perda de células epiteliais ou de tecido conjuntivo e até mesmo perda óssea no segundo molar. O presente estudo randomizado, controlado, cego e de boca dividida tem como objetivo comparar o reparo tecidual de duas incisões em cirurgia de remoção de terceiro molar retido. As remoções cirúrgicas foram realizadas e, após, foram analisados dados como exame periodontal, questionário, avaliação clínica pós-operatória, avaliação do perímetro pós-operatório do alvéolo, fotografias e radiografias, avaliando condições periodontais, percepção do paciente, cicatrização de tecidos moles e reparo ósseo. Resultados parciais mostram que a incisão com relaxante na mesial do segundo molar apresenta melhores desfechos, principalmente nos primeiros controles pós-operatórios, demonstrando uma cicatrização em primeira intenção. Portanto, esta abordagem tem melhor indicação quanto ao pós-operatório de cirurgia de terceiro molar inferior retido. Palavras-chaves: dente serotino, dente impactado, periodonto

eP1513

Análise do comportamento das células de linhagem de carcinoma espinocelular de boca expostas a um microambiente ácido

Bianca de Bem Prunes, Júlia Silveira Nunes, Viviane Palmeira da Silva, Pantelis Varvaki Rados, Fernanda Visioli - UFRGS

O microambiente tumoral é caracterizado por baixos níveis de oxigênio, diminuição dos nutrientes disponíveis e um pH tecidual