BLOQUEIO ANESTÉSICO NA NEURALGIA TRIGEMINAL: RELATO DE CASO

Ingrid Pacheco, Alana Schmidt, Cláudia Abrão Biasuz, Bárbara de Lavra Pinto Aleixo, Fernanda Brochado, Karen Dantur Batista Chaves, Daniela Disconzi Seitenfus Rehm

Objetivos: Relatar o caso de um paciente com neuralgia trigeminal refratária, destacando a importância do diagnóstico diferencial entre os diversos tipos de dor orofacial e a relevância da abordagem interdisciplinar no manejo clínico. **Materiais e Métodos:** Paciente masculino, 58 anos, com diagnóstico de neuralgia trigeminal há 4 anos e esclerose múltipla desde os 14 anos. Em uso de carbamazepina, apresentou agudização da dor em 2025. Em 2024, realizou fotobiomodulação sem melhora. O tratamento atual foi realizado no Projeto de Extensão SOS DTM, incluindo bloqueios anestésicos e terapias complementares. **Resultados:** Foi realizado o primeiro bloqueio do nervo alveolar inferior direito, com melhora substancial do quadro doloroso. Uma semana depois, realizou-se segundo bloqueio do nervo alveolar inferior e superior, associado a agulhamento infiltrativo bilateral em músculos masseteres. O paciente segue em acompanhamento, recebendo tratamento para dor neuropática e para disfunção temporomandibular muscular, com uso de placa estabilizadora e abordagem multidisciplinar com fisioterapia e fonoaudiologia. **Conclusão:** O caso demonstra que o bloqueio anestésico pode ser uma alternativa eficaz no controle da dor em pacientes com neuralgia trigeminal refratária, reforçando a importância da avaliação criteriosa e do diagnóstico diferencial para o manejo adequado da dor orofacial.

Palavras-chave: Neuralgia do Trigêmeo. Bloqueio Anestésico. Dor Orofacial.