Atenção Integral em Saúde de Crianças na Primeira Infância: A Importância das Bebês Clínicas

Marcia C. Figueiredo, Vanessa C. Barreto, Cynthia Guarienti

A educação materna voltada para mudanças de concepções e valores culminam na adoção de hábitos saudáveis. Diante da importância da promoção de saúde bucal já no 1º ano de vida e conscientes das dificuldades enfrentadas pelos dentistas para o atendimento de bebês, a FO/ODONTO/UFRGS iniciou em 1990 o programa de atenção odontológica para bebês enfocando o atendimento da faixa etária de 0-3 anos. Adota uma filosofia centrada na educação/prevenção, aliada às medidas de tratamento para as doenças já instaladas. A abordagem precoce prioriza a orientação: na amamentação, formação de hábitos dietéticos e de higiene bucal, presença de hábitos e o papel dos pais na promoção da saúde bucal de seus filhos. O perfil dos pacientes atendidos e a efetividade do tratamento proposto, foram base para esse estudo longitudinal, analisando as variáveis: controle de placa: qualidade da dieta e atividade de cárie dos 1009 pacientes de até 36 meses de idade atendidos durante um ano. Observou-se aumento dos pacientes com bom controle de placa e com dieta não-cariogênica e diminuição dos pacientes com atividade de cárie. Conclui-se: um protocolo eficiente voltado para a saúde integral do paciente e profissionais capacitados para trabalharem com esta faixa etária, torna-se possível a melhora nas condições de saúde bucal dos bebês e conseqüentemente das mães,pela conscientização dessas na aquisição de novos hábitos.

Avaliação Longitudinal da Efetividade do Curso de Extensão Universitária Bebê Clínica da FO-UFRGS de 2003 A 2005

Cinthya Aline Das Dores Guarienti, Márcia Cançado Figueiredo, Jorge Artur Michel, Mircelei Saldanha Sampaio

Sabendo da importância da promoção de saúde bucal nos primeiros anos de vida o programa Bebê Clínica oferece aos profissionais e estudantes de odontologia a capacitação para o atendimento desta importante parcela da população. Através de filosofia centrada nas manobras educativo/preventivas, aliada às medidas de tratamento alternativo para as doenças já instaladas, o programa integra o ensino às necessidades da população,oferecendo atendimento aos pacientes de 0 a 60 meses de idade. Com o propósito de avaliar a efetividade do tratamento proposto pela Bebê Clínica, realizou-se um estudo de caráter longitudinal, analisando as variáveis: CONTROLE DE PLACA : QUALIDADE DA DIETA e ATIVIDADE DE CÁRIE nos pacientes que participaram do programa. Participaram do estudo, inicialmente 1009 crianças de até 36 meses, que foram atendidas no ano de 2003. No ano de 2005 realizou-se novo exame nas mesmas crianças, onde houve uma perda na amostra de 19,04%, totalizando, ao final do estudo, 827 crianças. Confrontando os dados iniciais e finais através do teste Qui-Quadrado, observou-se aumento dos pacientes com bom controle de placa (21,27% - p d" 0,05), aumento dos pacientes com dieta não-cariogênica (32,13% - p d" 0,05) e diminuição dos pacientes que possuíam lesões de cárie ativas (33,96% - p d" 0,05). Obteve-se melhora estatisticamente significante para todas as variáveis, salientando a importância da capacitação dos dentistas para a atuação nesta faixa etária, diminuindo a ocorrência das doenças bucais e realizando de fato a promoção de saúde bucal.

Aumento de Mucosa Mastigatória com Finalidade Estética

*Luciano Augusto CHIAPINOTTO: Antônio Augusto IPONEMA: Fabiana Amaral CHIAPINOTTO: Geraldo Augusto CHIAPINOTTO

- Resumo: A Odontologia atual vem se preocupando, de modo considerável, com procedimentos reabilitadores que visam satisfazer as exigências estéticas dos pacientes. Nesse sentido a Periodontia como não poderia ser diferente, vem evoluindo rapidamente a ponto de mudar o enfoque estritamente a serviço da saúde, para uma postura que prioriza também a melhoria da estética, contribuindo para a satisfação do paciente e de sua própria auto-estima. O tratamento estético de raízes parcialmente desnudas pode se valer de diferentes técnicas de cirurgia plástica periodontal. O objetivo do presente trabalho é apresentar um caso clínico de tratamento de recessão gengival empregando o deslize lateral de retalho num sítio e enxerto livre de gengiva em outros, com resultado clínico quinze anos do pós-operatório. O retalho posicionado lateralmente é uma alternativa para recobrimento radicular cujo sítio doador é representado pela gengiva adjacente ao sítio a ser tratado. O enxerto livre de gengiva é baseado no princípio da remoção da mucosa mastigatória de local doador e sua transferência para um leito receptor previamente preparado. Ambas as técnicas utilizadas apresentaram resultados bastante significativos em relação ao aumento da espessura do tecido gengival e condição estética, contribuindo para a manutenção da saúde gengival.

Campanha de Prevenção de Câncer Bucal de 2005 em Novo Hamburgo-RS

Fernanda Visioli, Elisabete Ulsenheimer Rojas, Sabrina Pozatti Moure, Pantelis Varvaki Rados

A Campanha de Prevenção de Câncer Bucal promovida pela Liga Feminina de Combate ao Câncer e pelo Programa de Pós-Graduação em Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia da UFRGS em 2005 na cidade de Novo Hamburgo/RS realizou o exame de 307 pessoas, sendo 71% (218) mulheres e 29% (89) homens, com idade média de 51 anos. Do total, 31% (94) indivíduos apresentaram algum tipo de lesão bucal. O diagnóstico clínico destas lesões distribuiu-se entre as seguintes lesões: 28% (26) hiperplasias inflamatórias: 23% (22) candidíase: 11% (10) tumores benignos: 12% (11) lesões cancerizáveis: 1% (1) carcinoma espinocelular: 9% (8) lesões auto-imunes e 18% (17) outras lesões. Dos 77 indivíduos encaminhados para tratamento, 38 compareceram à consulta marcada. A biópsia foi realizada em 11% (4) destes. O indivíduo cujo diagnóstico clínico foi carcinoma espinocelular não compareceu à consulta. Quanto aos hábitos etiológicos relacionados com o câncer bucal, 21% (64) dos indivíduos eram fumantes ou ex-fumantes, 16% (49) consumiam bebidas alcóolicas e 74% (228) ingeriam bebidas quentes. Quanto à saúde geral 43% (131) apresentavam alterações sistêmicas como hipertensão arterial e diabetes e 42% (130) faziam uso de medicação (antihipertensivos, antidepressivos, insulina). Atividades como esta são importantes na medida em que servem de alerta quanto às possibilidades de câncer em boca e dos seus fatores etiológicos.

Avaliação de Diferentes Fontes de Polimerização na Resistência de União de "Brackets" Colados ao Esmalte Dentário

Niége Michelle Lazzari de Onofre, Luciana Borges Retamoso, Ernani Menezes Marchioro

A resina composta é um dos materiais mais utilizados para a colagem ortodôntica, sendo que, a sua polimerização ocorre através da energia luminosa. A luz halógena é a fonte luminosa mais utilizada, pois apresenta baixo custo e fácil manutenção. Entretanto, o tempo necessário para a polimerização dos materiais é longo e a vida útil dos aparelhos fotopolimerizadores é relativamente curta. A fotoativação através do LED (ligth emitting diode) vem ganhando espaço, pois apresenta um tempo curto para a polimerização dos materiais e uma vida útil longa. Esse estudo teve o objetivo de determinar "in vitro" a influência da luz halógena e do LED na resistência de união de "brackets" colados ao esmalte de dentes humanos. Como material de colagem foi utilizado a resina ortodôntica Transbond XT (3M-Unitek – Br). Foram selecionados 20 pré-molares, os quais foram preparados para colagem através de profilaxia e condicionamento do esmalte com ácido ortofosfórico à 37%. Então, os corpos-de-prova foram divididos em 2 grupos de acordo com a fonte luminosa utilizada para polimerização: GrupoI– fotoativação pela luz halógena por 40 segundos: GrupoII- fotoativação pelo LED por 15 segundos. Após 24 horas, os 2 grupos foram submetidos ao teste de cisalhamento com velocidade de 1mm por minuto até a descolagem do "bracket". Os resultados obtidos através do Teste t de Student demostraram que não houve diferença estatística na resistência de união entre o Grupo I (14,96MPa 5,70) e o Grupo II (13,08MPa 4,33). Concluiu-se que, tanto a luz halógena quanto o LED propiciam força adequada para a colagem ortodôntica.

Carcinoma Basocelular - Relato de Caso Clínico

Cláudio Affonso Lermen, Fernanda Visioli, Deise Ponzoni, Edela Puricelli

Objetivo: relatar o processo diagnóstico de lesão em lábio superior de um paciente atendido na Disciplina de Patologia Cirúrgica, Faculdade de Odontologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Descrição do caso: U. S., 70 anos, gênero masculino, leucoderma, exfumante, procurou atendimento devido a lesão nodular com 8mm de diâmetro em lábio superior. Após biópsia incisional, em março de 2006, sob anestesia local, o exame histopatológico mostrou ilhas epiteliais de células basalóides e cordões entrelaçados de células malignas que lembravam a formação de ductos, invadindo o tecido conjuntivo fibroso, com o diagnóstico de carcinoma basocelular. O carcinoma basocelular é uma neoplasia epitelial maligna, considerada o câncer de pele mais comum. O fator etiológico é a exposição crônica à radiação ultravioleta. É mais freqüente em adultos acima de 40 anos, principalmente aqueles de pele clara. O paciente foi encaminhado para tratamento no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Conclusão: o prognóstico de lesões malignas depende, muitas vezes, do momento em que o diagnóstico é realizado e o cirurgião-dentista desempenha um papel importante neste processo.