

136

TAXA DE PREENHEZ EM REBANHOS OVINOS DO RIO GRANDE DO SUL NO PERÍODO REPRODUTIVO DE 2007. *Samuel Carnesella, Gustavo Felipe Lopes, Marcelo Cristiano Acker, Fernando Magalhães de Souza, Carla Menger Lehugeur, Luiz Alberto Oliveira Ribeiro (orient.)*

(UFRGS).

A eficiência reprodutiva de rebanhos ovinos é medida pela porcentagem de cordeiros desmamados. Esse índice está associado a porcentagem de prenhes do rebanho. No presente estudo são apresentados dados sobre o diagnóstico de gestação realizado por ultra-sonografia em cinco rebanhos de três propriedades no período reprodutivo de 2007. Foram examinadas 4.116 ovelhas de rebanhos comerciais encarneiradas no outono. A porcentagem de prenhez (PP) variou de 56,7 a 91,5%, com uma PP média de 80,5%. As PP observadas nas diferentes raças foram as seguintes: Merino Australiano 91,1%, Border Leicester 91,5%, Corriedale 57,3%, Hampshire Down 56,7% e ovinos cruza 71,7%. Baixos índices de prenhez foram observados nas raças Corriedale e Hampshire Down provavelmente associada a um manejo reprodutivo inadequado. Finalmente, concomitantemente com o diagnóstico de gestação, foi avaliada a condição corporal (CC) de 1240 ovelhas de três rebanhos em três propriedades (PP média = 70,5%). A CC média das ovelhas prenhes e vazias foi de 3,03 e 3,24 respectivamente. A CC média das ovelhas prenhes foi discretamente inferior a observada nas ovelhas vazias. Isso provavelmente está relacionado com a maior demanda de nutrientes gerada pela gestação.