

043

O IMPACTO DA FIBROMIALGIA CONCOMITANTE NA AVALIAÇÃO DO HAQ E DO DAS28 NOS PACIENTES COM ARTRITE REUMATÓIDE. *Felipe Cunha Birriel, Aline Ranzolin, Claiton Brenol, Jairo Guarienti, Marcele Rizzatti, Rodrigo Daoud, Paulo Franciscatto, Rafael Pereira, Angela Massignan, Ricardo Xavier, Joao Carlos Tavares Brenol (orient.)* (UFRGS).

Introdução. Em pacientes com Artrite Reumatóide (AR), o DAS28 (Disease Activity Score) e o HAQ (Health Assessment Questionnaire) são importantes instrumentos utilizados para avaliar a atividade de doença e a capacidade funcional, respectivamente. Alguns pacientes com AR têm Fibromialgia (FM) associada. Podendo os sintomas de FM ter impacto nas avaliações do HAQ e do DAS28 em pacientes com AR. **Métodos.** O presente estudo foi conduzido em pacientes com AR atendidos no ambulatório de Reumatologia do HCPA entre 2006 e 2007. Todos esses foram avaliados para FM pelos critérios do American College of Rheumatology (ACR) e submetidos às avaliações de HAQ e DAS28. **Resultados.** Foram avaliados 257 pacientes com AR, sendo que 28 (10.9%) tinham FM associada. Pacientes com AR e FM tiveram maiores escores de incapacidade funcional (HAQ 1, $23 \pm 0,85$) e de atividade da doença (DAS28 5, $54 \pm 1,11$) quando comparados com pacientes com AR sem FM (HAQ 1, $95 \pm 0,58$ e DAS28 4, $15 \pm 1,48$, respectivamente; $p < 0,001$). **Conclusão.** Os valores do DAS28 e HAQ em pacientes com AR e FM concomitante devem ser considerados com cautela, já que níveis de dor mais elevados podem levar a escores finais mais altos, os quais, em alguns casos, podem indicar sintomatologia da FM ao invés de atividade da AR. (PIBIC).