

O carcinoma brônquico é o tumor visceral de ocorrência mais comum na comunidade, em ambos os sexos, responsável também pelo maior número de óbitos que acometem a espécie humana. Responde por cerca de 90% da totalidade dos tumores que envolvem o pulmão. O diagnóstico é feito geralmente num paciente com 50 anos de idade, do sexo masculino, grande fumante o qual apresenta há poucos meses ou algumas semanas manifestações respiratórias e que tem radiografia de tórax normal. Clinicamente, a maioria dos pacientes com metástase apresenta um quadro assintomático. Assim, a pesquisa dos principais sítios metastáticos e dos métodos mais sensíveis utilizados para identificá-los constitui o objetivo deste estudo. Desta forma realizou-se o acompanhamento de 110 pacientes, internados na Santa Casa de Misericórdia referentes ao período de setembro de 1995 à maio de 1996, com diagnóstico de carcinoma brônquico. Obtiveram-se os dados como idade, sexo, quantidade e tempo de exposição ao fumo, manifestações metastáticas intratorácicas extra-pulmonares, manifestações extra-torácicas metastáticas, manifestações extratorácicas metastáticas, manifestações extratorácicas não metastáticas e métodos diagnósticos a partir de um protocolo previamente estabelecido.