



Evento	Salão UFRGS 2014: SIC - XXVI SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2014
Local	Porto Alegre
Título	Características Clínicas de Pacientes Cirúrgicos com o Diagnóstico de Enfermagem Integridade Tissular Prejudicada
Autor	BRUNA PAULSEN PANATO
Orientador	MIRIAM DE ABREU ALMEIDA

Introdução: As lesões constituem problemas graves e caros, sendo um dos focos na qualidade do cuidado e segurança ao paciente. A equipe de enfermagem, ao prestar cuidado direto e durante as 24h, precisa de um olhar atento e competente para identificar, prevenir e/ou minimizar os fatores de risco e a existência de lesões durante a internação dos pacientes. Neste sentido, ao avaliar os Diagnósticos de Enfermagem (DE) mais frequentes no Serviço de Enfermagem Cirúrgica (SEC) de um hospital, identificou-se o DE *Integridade Tissular Prejudicada* (ITP), que tem como definição “dano às membranas mucosas, córnea, pele ou tecidos subcutâneos” e está contemplado no domínio 11 (segurança/proteção) e na classe 2 (lesão física) da taxonomia II da NANDA *International - NANDA-I*. **Objetivo:** Caracterizar os pacientes internados no SEC com o DE *Integridade Tissular Prejudicada* e identificar os cuidados de enfermagem mais frequentemente prescritos. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo-exploratório retrospectivo com abordagem quantitativa realizado em hospital universitário, nos meses de abril a junho de 2014. Foram analisados 312 prontuários eletrônicos, selecionados por amostragem aleatória simples em programa estatístico SPSS versão 18. Incluíram-se pacientes internados no SEC, no ano de 2013, que apresentaram o DE em estudo. Não foram previstos critérios de exclusão. A pesquisa foi realizada em três etapas: na primeira foi solicitado um levantamento dos pacientes que tiveram ITP durante a internação no ano da coleta; na segunda etapa foi realizada a coleta das variáveis em prontuário eletrônico por meio de um instrumento construído no programa Microsoft Excel 2010; na terceira etapa realizou-se mapeamento cruzado dos cuidados mais frequentes com as intervenções da Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). A análise dos dados foi feita no SPSS versão 18, com médias e desvio padrão para variáveis contínuas e percentil para variáveis categóricas. O projeto foi aprovado em Comissão de Pesquisa e Comitê de Ética em Saúde do hospital (nº140073). **Resultados:** As características observadas nos pacientes do SEC com ITP foram: tempo de internação médio de 10,29 ($\pm 19,03$), idade de 52,51 ($\pm 18,51$), predominantemente do sexo feminino (52,80%). A maioria dos pacientes internou para realização de cirurgia (88,40%), 36,84% dos pacientes tinham HAS e 16,77% Diabete Mellitus. Grande parte dos pacientes apresentava sobrepeso ou obesidade (45,1%); 18,5% eram tabagistas; 34,80% estavam restritos ao leito e 31,80% podiam andar normalmente; 86,96 apresentavam ferida operatória e apenas 5,70% úlcera por pressão. Os cuidados de enfermagem prescritos para $\geq 50\%$ dos pacientes foram: Verificar sinais vitais (99,48%); Implementar Cuidados na Punção Venosa (89,35%); Avaliar aspecto da ferida operatória (77,66); Monitorar sangramento (69,61); e Inspeccionar a pele em busca de pontos hiperemiados ou isquêmicos (67,27), sendo mapeados com intervenções contempladas nos domínios Fisiológico Complexo e Segurança da NIC. **Conclusão:** O estudo possibilitou caracterizar clínica e sócio demograficamente os pacientes que receberam o Diagnóstico de Enfermagem *Integridade Tissular Prejudicada* no Serviço de Enfermagem Cirúrgica. Essa caracterização pode contribuir para o refinamento do diagnóstico, pois algumas das variáveis encontradas não estão presentes neste DE, seja como característica definidora ou fator relacionado.

Descritores: Diagnóstico de Enfermagem; Cuidados de Enfermagem; Pele.