

FATORES PROGNÓSTICOS DE SIGNIFICÂNCIA CLÍNICA EM PACIENTES COM METÁSTASES HEPÁTICAS DE TUMORES COLORRETAIS. Espinel JO , Berger A , Lima C , Kochenborger C , Bevilacqua F , Contu PC , Contu SS , Lima

FC, Jurach MT , Moreira LF . Programa de Pos-graduacao em Medicina: Cirurgia . HCPA - UFRGS.

Metástases de tumores primários colorretais são relativamente freqüentes e mais de um terço dos pacientes com tumores colorretais tendem a desenvolver metástases hepáticas. Embora muitos desses pacientes apresentem-se com tumores irresssecáveis ao diagnóstico, estima-se que aproximadamente 5 a 10% destes pacientes são potencialmente curáveis pela ressecção das lesões hepáticas. Vários estudos retrospectivos recentes têm evidenciado que a ressecção hepática é a única alternativa com chances de prolongar a sobrevida dos pacientes ou mesmo curar a doença. Assim, ressecção cirúrgica combinada ou não com outros tratamentos adjuvantes, tornou-se a primeira escolha para câncer colorretal metastático, e o objetivo deste estudo é o de abordar as principais características clínico-patológicas dos pacientes com metástases, as indicações e os benefícios da ressecção e os principais elementos implicados nas ressecções de grande porte (hepatectomias e trisegmentectomias). A experiência dos autores com este tipo de ressecção será apresentada e discutida em relação as melhorias nos métodos de detecção, de localização, e de diagnóstico, e avanços nos cuidados operatórios e peri-operatórios, com a consequente diminuição das taxas de morbidade e mortalidade para este tipo de lesão.