

**1113****RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS CLÍNICAS E QUALIDADE DE VIDA AUTO-RELATADA EM PACIENTES ADULTOS COM FIBROSE CÍSTICA**

Gabriele Carra Forte, Gabriela Cristofoli Barni, Cristiano Perin, Fernanda Cano Casarotto, Simone Chaves Fagondes, Paulo de Tarso Roth Dalcin. Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

**Introdução:** Com a melhoria da expectativa de vida em Fibrose Cística (FC), a qualidade de vida ganhou fundamental interesse. **Objetivo:** avaliar a associação entre variáveis clínicas, nutricionais, de função pulmonar, qualidade do sono e variáveis polissonográficas com dois questionários de qualidade de vida: questionário geral proposto pela OMS (WHOQoL) e questionário específico para pacientes com FC (CFQV), em pacientes adultos com FC no sul do Brasil. **Métodos:** Estudo transversal, envolvendo 51 pacientes, com FC clinicamente estáveis. Foram submetidos à avaliação clínica e nutricional, aplicação de questionário de qualidade de vida, polissonografia e questionário do sono (Índice de qualidade do sono de Pittsburg- IQSP e Escala de sonolência de Epworth - ESE). Além disso, foram avaliadas função pulmonar, distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos (TC6) e ecocardiograma. **Resultados:** considerando o escore WHOQoL, IQSP foi associado com domínio físico; distância percorrida no TC6 e ESE com domínio psicológico, IQSP com domínio ambiental; e VEF1% previsto e IQSP com domínio de relação social. Considerando o CFQV, idade do diagnóstico, escore clínico e IQSP foram associados com o domínio de função física; distância percorrida no TC6 e pressão pulmonar arterial sistólica (PPAS) com domínio papel social; gênero e IQSP com domínio vitalidade; sexo e IQSP com o domínio vitalidade; sexo e IMC com o domínio da imagem corporal; distância percorrida no TC6 e IQSP com domínio percepções de saúde; idade, sexo, IMC e índice de excitação com o domínio de peso; idade, sexo, VEF1% do previsto, distância percorrida no TC6 e PPAS com o domínio sintomas respiratórios; e escore de Shwachman-Kulczycki (S-K) com o domínio sintomas digestivos. **Conclusão:** Escore IQSP, distância percorrida no TC6, ESE e VEF1% do previsto foram preditores independentes dos domínios do escore de WHOQoL; por outro lado, a idade do diagnóstico, o S-K, IQSP, distância percorrida no TC6, sexo, IMC, idade, índice de excitação, FEV1% do previsto e PPAS foram preditores dos domínios do CFQV. **Palavra-chave:** fibrose cística; qualidade de vida; qualidade do sono.