

1252

ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS MENTAIS SEGUNDO DIAGNÓSTICO PRINCIPAL NA ALTA HOSPITALAR EM PACIENTES INTERNADOS NO SERVIÇO DE PSIQUIATRIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE NOS ÚLTIMOS 12 ANOS

Pedro Barbieri Ferronato, Carlos Henrique Pappen, Fabrício Casarin, Leonardo Castilho, Estêvão Naoto Gutierrez, Marcos Guilherme Tibes Pauletti, Gabriel Paludo, Mariza Machado Kluck. Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Introdução: este estudo foi realizado junto ao Serviço de Arquivo Médico e Informações em Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), baseado em dados da Internação Psiquiátrica. O Serviço de Psiquiatria do HCPA é referência em atendimento a pacientes com transtornos mentais e dispõe de internação para transtornos mentais gerais e para transtornos relacionados ao uso de drogas, recebendo pacientes com as mais diversas indicações de internação hospitalar. Objetivos: analisar a prevalência dos transtornos mentais nos pacientes internados nos últimos 12 anos. Métodos: foram coletados dados do aplicativo de gestão do HCPA de 2002 até 2013, considerando como referência o diagnóstico da alta, segundo o CID 10. Posteriormente foi feita a sua análise tendo-se como base a porcentagem de determinado CID sobre o total de internações no período de um ano. Resultados: de 2002 a 2011, os Transtornos de Humor lideram o número de internações, com média de 46% do total de internações. A seguir vemos os Transtornos Esquizofrênicos, os Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias e os Transtornos de Personalidade, com média de 19, 11 e 7%, respectivamente. Outros transtornos totalizam 15% dos diagnósticos nesse período. Durante o mesmo período as proporções dos diferentes diagnósticos seguem com tendência de constância no decorrer dos anos. Porém, os dados sofrem grande variação após a instalação da Unidade Álvaro Alvin (UAA), dedicada ao tratamento de transtornos relacionados a substâncias, em 2012. Nesse novo cenário os Transtornos relacionados ao Uso de Substâncias passam ao topo dos diagnósticos de internação, com 42% do total, seguido dos Transtornos de Humor e Esquizofrênicos, com 28 e 17%, sendo que os demais transtornos totalizando 13% dos diagnósticos. Conclusões: os Transtornos do Humor lideram as internações na psiquiatria geral, e as proporções dos diferentes diagnósticos possuem tendência de constância no decorrer dos anos até a instalação da UAA. Um dos motivos desta mudança nas proporções dos diagnósticos é que a média de permanência dos pacientes com Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias na UAA é 10 dias, enquanto que a dos pacientes da psiquiatria geral é 30 dias. Trabalho isento de aprovação por comitê de ética. Palavra-chave: internação; psiquiatria; diagnósticos.