

METÁSTASES LINFONODAIS RETROPERITONEAIS DE TUMORES COLORRETAIS

FABIOLA FERNANDES MARTINS; MARIO ANTONELLO ROSITO; DANIEL DE CARVALHO DAMIN;
CLAUDIO TARTA; PAULO DE CARVALHO CONTU; LETICIA FRANKE GONÇALVES

Introdução: Metástases retroperitoneais de tumor de cólon são raras, não havendo consenso na literatura quanto ao tratamento destas lesões. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência cirúrgica de dois casos de câncer colorretal que desenvolveram volumosas metástases linfonodais retroperitoneais. O primeiro paciente apresentou tumor retroperitoneal aderido à aorta e ao hilo renal, de aproximadamente 10 cm, ressecado com ligadura de ramos da aorta, necessidade de nefrectomia e ressecção parcial do músculo psoas. O segundo caso apresentou lesão tumoral medial ao rim esquerdo, de 6 cm de diâmetro, também ressecado com ligadura de ramos da aorta. Em ambos os pacientes foram obtidas margens livres. Após dois anos de seguimento, o primeiro caso apresenta-se assintomático. O segundo paciente não apresenta sinais de recidiva 3 meses após o procedimento. Conclusão: nossa experiência sugere que o tratamento cirúrgico deva ser considerado como alternativa terapêutica inicial no manejo das metástases ganglionares retroperitoneais de câncer colorretal.