

3 3 2 RIM EM FERRADURA:APRESENTAÇÃO CLÍNICA.M.F.Silveira, J.Mãrsico.K.Boianovsky,M.C.G.Meirelles A.M.Botta, N.P.Goldraich. (Nefrologia Pedãtrica do Hospital 4 Clinicas de Porto Alegre)

O rim em ferradura Á uma anomalia de fusão do rim,o - correndo em 1:400 habitantes.

O objetivo deste estudo retrospectivo foi analisar as .condições nas quais foi feito este diagnóstico e a asso - ciação com outras patologias. Foram estudados 6 pacientes, .sendo 2 do sexo masculino e 4 do feminino. As idades, no momento do diagnóstico, variaram e.ntre 8 meses e 7,5 anos :(idade média:2,7 + 2,8 anos). O motivo da consulta destes pacientes foi infecção urinária(2), bexiga neurogênica(2), incontinência urinária noturna(1)e hipertensão arterial sistêmica(1). A cintilografia renal com PMSA fez o diag - nóstico desta anomalia em 3 pacientes e a urografia excre - tória em outros 3.As patologias associadas foram refluxo v-esicoureteral em 2 pacientes, nefropatia do refluxo em 2 .e síndrome de Arnold-Chiari em 1 paciente. O período de se 'guimento destes pacientes variou de 3 meses a 11 anos(3,38 + 4,02 anos). Nenhum paciente apresentou h matúria ou li - tiase, que são relatados com frequência aumentada nestes pacientes.

Conclusão: A presença do rim em ferradura é um achado casual durante a investigação do trato urinário.(CNPq)