
GESTACIO EM MULHERES COM MAIS DE 30 ANOS DE IDADE: PADRO DE CONSUMO DE MEDICAMENTOS. Bezerra RC, Gritti LA, Sobreiro BP, Garcias GL, Roth HGH
<Depto. de Zoologia e Genética da UFPel>
Agência Financiadora: FAPERGS

Devido a mudanças ocorridas na nossa sociedade, hoje em dia existem muito mais gestantes acima dos 30 anos de idade do que em algumas décadas atrás. Em virtude do conhecido risco de uma gestação nessa faixa etária resolve-se realizar uma análise descritiva preliminar do padrão de consumo de medicamentos na mesma, para tal utilizamos dados derivados de 945 nascimentos consecutivos ocorridos na rede hospitalar da cidade de Pelotas no período de janeiro e fevereiro de 1992. Foram utilizados em média 3,4 princípios ativos CPA por gestante, sendo que 6% delas usou até 3. O grupo terapêutico mais utilizado foi o dos medicamentos ativos no metabolismo (7,3%), seguidos pelos analgésicos, antiinflamatórios e antipiréticos (11,8%), depois os anti-infecciosos sistêmicos (8,5%). Nota-se que houve um aumento global do consumo de medicamentos na gestação do início ao final da gestação. Nenhum grupo terapêutico isoladamente foi responsável por esse aumento.