

P 4467

Avaliação sobre estudo de utilização do medicamento metadona pelo programa de farmacovigilância de hospital universitário

Marina Delanni Vitória, Fernanda Rossatto Machado, Bruno Simas da Rocha, Deise Luisa Locatelli, Jacqueline Kohut Martinbiancho

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Introdução: Estudos de utilização de medicamentos possuem como estratégia a racionalização do uso de fármacos evitando usos não indicados e prevenindo a ocorrência dos efeitos adversos. Nesse contexto, torna-se necessário o monitoramento de medicamentos recentemente padronizados em hospitais. A metadona injetável tem como principal indicação o tratamento de dor crônica, sendo utilizada principalmente no tratamento da dor crônica e em pacientes oncológicos. **Objetivo:** Avaliar o uso de metadona injetável, medicamento recentemente incluído na seleção de medicamentos de hospital universitário terciário. **Métodos:** Estudo observacional descritivo, em que foram incluídos todos os pacientes com prescrição de metadona injetável. As variáveis analisadas incluíam o perfil dos pacientes que utilizaram a metadona, adequação de indicação e dose, tempo de uso e incidência de reação adversa ao medicamento (RAM), em Hospital Terciário Universitário, durante o período de dezembro/2014 a maio/2015. **Resultados:** Foram avaliados 41 pacientes com prescrição do medicamento durante o período proposto. Entre os pacientes, 51,2% eram do sexo feminino e 48,8% eram do sexo masculino. A idade variou entre pacientes com 5 meses e 80 anos. A principal indicação foi para analgesia (95,1%) e as demais indicações não foram encontradas na literatura. Foi observado no estudo que 100% dos pacientes utilizaram o medicamento nas doses indicadas nas fontes de informações sobre medicamentos disponíveis, porém, somente em 92,4% dos pacientes esta dose se mostrou eficaz. O tempo de permanência do medicamento na prescrição foi em média de 10,7 dias. Reações adversas foram descritas em 14,6% dos pacientes. Entre as reações apresentadas, foram descritas: constipação, tonturas, náuseas, calafrios, distensão abdominal e prurido. **Conclusão:** O estudo demonstrou que foi utilizado na instituição o medicamento em doses e indicações de acordo com o preconizado na literatura atualizada disponível. Também foi possível observar que a incidência de RAM se manteve dentro de taxas aceitáveis, fazendo com que o uso do medicamento seja seguro. Desta forma, é possível inferir que a padronização deste medicamento se mostrou adequada e segura na instituição. **Palavras-chaves:** Estudo de utilização de medicamento, metadona, medicamentos padronizados recentemente.