

## A INFLUÊNCIA DO TIPO DE PARTO E DA DIETA MATERNA NO PERÍODO DE ALEITAMENTO MATERNO

*Fernanda Wisniewski, Daniela Benites Rosito, Erissandra Gomes, Márcia Cançado Figueiredo.*

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Os aspectos pré-natais podem influenciar no tempo de amamentação dos recém-nascidos, que quando reduzido traz prejuízo ao seu desenvolvimento crânio-orofacial. Objetivo: Correlacionar o tipo de parto e a dieta materna com período de amamentação. Métodos: Este foi um estudo descritivo com base em registros de prontuários de 820 mães e recém-nascidos participantes da Extensão Universitária Bebê Clínica. Os resultados foram analisados, considerando o nível de significância de 5%. Resultados: A inexistência de intercorrência durante a gestação foi um fator positivo para a ocorrência de parto normal em 94% da amostra ( $p < 0,001$ ). Apurou-se um percentual elevado de parto cesárea (43%). O número de cesarianas em mulheres com dieta cariogênica foi maior que em mulheres com dieta não cariogênica. Mulheres que possuem uma dieta não cariogênica tiveram uma tendência a amamentar seus filhos por mais de 6 meses ( $p < 0,01$ ). Também houve associação entre parto normal e período maior de 6 meses de amamentação ( $p < 0,001$ ). Conclusão: Na amostra pesquisada o tipo de parto e a dieta materna influenciaram no tempo de aleitamento materno.

Descritores: Aleitamento materno, Parto, Dieta cariogênica.