

**142 ANÁLISE DO LAVADO BRONCOALVEOLAR NOS PACIENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR.** Marcelo Marsillac Matias e Rogério Gastal Xavier. (Serviço de Pneumologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

Foram acompanhados num período de 6 meses pacientes do centro de saúde do município de Canoas (RS). Aqueles com suspeita clínico-radiológica de tuberculose pulmonar, teste tuberculínico, reator forte e baciloscopia negativo, foram encaminhados a exame fibrobroncoscópico para lavado broncoalveolar. A amostra constuiu-se de 20 pacientes: 17 com lesões localizadas de disseminação brônquica e 3 com lesões miliares de disseminação hemática. Naqueles com lesões localizadas foi realizado lavado broncoalveolar no pulmão contra-lateral (lavado controle). Todos foram submetidos a tratamento de prova padrão (RHZ). Dezesesseis concluíram satisfatoriamente com critério de cura clínico-radiológica e 4 foram excluídos: 2 por abandono, 1 por mudança de diagnóstico e 1 por técnica insatisfatória. A cultura para Mycobacterium tuberculosis foi positiva em 2 pacientes com tuberculose e em 6 com lesões localizadas. Observou-se aumento na proporção de neutrófilos tanto nas lesões localizadas (X = 14,5%) como nos lavados controle (X = 6,3%). Nas lesões miliares, proporção variada de células foi verificada. Nos pacientes com cultura positiva evidenciou-se maior proporção de neutrófilos tanto nas lesões localizadas (X = 29,7%) como nos lavados controle (X = 10,3%) em relação àqueles com cultura negativa.