

223 ASCARIDÍASE EM VIAS BILIARES: RELATO DE DOIS CASOS DE NECRÓPSIA. Maria Beatriz Baptista Valim, Daniela Diebold, Rafael Castilho Pinto, Maria Isabel Edelweiss. (Departamento de Patologia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

A presença de Ascaris lumbricoides nas vias biliares causando obstrução é situação incomum, podendo nestas circunstâncias levar ao óbito. Estudamos dois casos de necrópsia cuja causa mortis foi obstrução extra e intra hepática por Ascaris lumbricoides sp. No primeiro caso tratava-se de paciente feminina, 40 anos, que na baixa apresenta náuseas, vômitos, hipertermia, icterícia e diagnóstico radiológico de abdome agudo. Foi submetido à colicistectomia com drenagem de abscessos e remoção de vermes das vias biliares. No pós-operatório imediato foi ao óbito. Na necrópsia havia infestação maciça do intestino e esôfago. O fígado apresentava focos de supuração de onde foram isolados exemplares de áscaris. O segundo caso era de criança, masculina, 1 ano e 3 meses, com diarreia, vômitos, hipertermia, tosse seca e anasarca. Com diagnóstico provável de miocardite, fez uso de penicilina, corticóide, digital e diurético. Após 14 dias apresentou piora do quadro e evoluiu para o óbito. Na necrópsia encontrou-se múltiplos abscessos hepáticos e obstrução biliar extra hepática por vermes. (CNPq)