



SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA XXVIII SIC

paz no plural



Evento	Salão UFRGS 2016: SIC - XXVIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2016
Local	Campus do Vale - UFRGS
Título	Associação entre preocupação e medidas de pior prognóstico em pacientes com Esquizofrenia e Transtorno Bipolar
Autor	ADAM FIJTMAN
Orientador	MARCIA KAUER SANT ANNA

Associação entre preocupação e medidas de pior prognóstico em pacientes com Esquizofrenia e Transtorno Bipolar

Autor: Adam Fijtman **Orientadora:** Marcia Kauer Sant'Anna

Instituição de origem: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução: A preocupação é uma sequência relativamente incontrolável de pensamentos primariamente verbais sobre eventos futuros incertos com potencial para desfechos negativos. Esta sequência é apontada como um processo transdiagnóstico central que permeia diferentes transtornos mentais. Entretanto, poucos estudos abordam a relação entre preocupação com Transtorno Bipolar e Esquizofrenia. **Objetivos:** Avaliar a correlação entre os níveis de preocupação, medida através da Escala de Preocupação Penn State (PSWQ), idade, tempo de doença, gravidade de doença e a funcionalidade em pacientes com diagnóstico de Esquizofrenia (SCH) e de Transtorno Bipolar (TB). **Métodos:** Estudo transversal com 131 pacientes ambulatoriais adultos (50,3% feminino), sendo 66 portadores de SCH (idade média 39 anos, DP 10,7) e 65 com TB (idade média 46, DP 13,9) provenientes de um hospital terciário. A Escala Breve de Avaliação de Funcionalidade (FAST) e a Escala de Preocupação Penn State (PSWQ) foram aplicadas a ambos os grupos. A correlação entre estas medidas foi realizada através da correlação de Pearson. A gravidade de doença foi avaliada por meio da escala de Impressão Clínica Global (CGI). **Resultados:** A correlação entre a PSWQ e idade ($r=0.179$, $p<0.05$) foi muito baixa, com a FAST ($r=0.458$; $p<0.001$) moderado e com a CGI ($r=0.224$, $p<0.05$) baixa para o grupo total de pacientes. Os resultados se mantêm similares mesmo quando analisamos os dois grupos de pacientes separadamente. **Conclusão:** Encontramos uma correlação positiva entre preocupação com as medidas de funcionalidade e gravidade FAST e CGI respectivamente na amostra de pacientes com SCH e TB. Estes achados se replicados em outras e maiores amostras indicam maior presença deste processo cognitivo quanto pior for a funcionalidade e a gravidade dos pacientes.