

eP2394

Cicatriz mínima na cirurgia plástica mamária

Emilaine Karine Lorencetti, João Maximiliano Pedron Martins, Miriam Pedron - HMM/HMD

Introdução: Comumente referida como cirurgia de lifting de mama, a mastopexia reposiciona a aréola e o tecido mamário, removendo o excesso de pele e comprimindo o tecido para compor o novo contorno da mama. A mastopexia não altera, significativamente, o tamanho dos seios ou preenche a parte de cima da mama (colo). Para redução de volume, pode se associar mamoplastia redutora e, para aumento de volume ou melhor preenchimento do polo superior, colocação de prótese. Objetivo: Descrever resultados obtidos com a nova técnica utilizada por 800 mulheres que se submeteram a mastopexia e mamoplastia redutora. Materiais e métodos: Esse estudo avaliou 800 pacientes que sofreram cirurgia entre 1987 e 2001 no Hospital Moinhos de Vento e no Hospital Divina Providência. 640 pacientes sofreram mamoplastia redutora sem prótese (incluindo 56 casos de reconstrução unilateral da mama). Mastopexia foi realizada em 160 pacientes. Anestesia peridural foi utilizada em 90% das pacientes e 10% das anestésias realizadas foi geral. A idade das pacientes que sofreram mamoplastia redutora variou entre 17 e 75 anos, com média de 40 anos de idade. No grupo de mastopexia, a idade variou entre 28 e 65 anos, com média de 26 anos. As pacientes foram conscientizadas da técnica, assinaram termo de consentimento da cirurgia e autorização do uso de imagens para trabalhos científicos. Resultados: A cicatriz pós operatória foi mínima em todas as pacientes. Ambos os resultados, imediato e tardio, foram satisfatórios e não requereram intervenção secundária para correção de ptose. 16 pacientes (2%) optaram por uma cirurgia adicional de redução de volume. Não houve casos de infecção. Hematoma ocorreu em 8 pacientes. 16 pacientes tiveram redução de sensibilidade temporária. Não foi observado seroma em nenhuma paciente. Conclusão: A técnica proposta provou ser eficaz em alcançar a cicatriz mínima e manter o resultado a longo prazo. Palavras-chaves: cirurgia plastica, mamoplastia, mastopexia