

PREVALÊNCIA DE MÁ OCLUSÃO E FATORES ASSOCIADOS NA PRIMEIRA INFÂNCIA.

Acadêmica: Natalia de Abreu Pegoraro
Orientador: Fernando Neves Hugo


INTRODUÇÃO

Má oclusão é um problema frequente em crianças de pouca idade, a qual modifica a qualidade de vida do indivíduo, pois interfere no sistema estomatognático e respiratório, sendo um problema de saúde pública. Por isso, é importante identificar quais fatores que mais interferem no aparecimento do mesmo para que haja uma intervenção mais precoce e eficaz na Atenção Primária à Saúde.

OBJETIVO

Avaliar a prevalência de má oclusão em crianças nascidas no ano de 2013, acompanhadas por um Serviço de Atenção Primária à Saúde.

MATERIAIS E MÉTODOS



RESULTADOS

Prevalência de Má Oclusão e seus Fatores Associados na Primeira Infância			
		Variáveis	N (%)
SOCIODEMOGRÁFICOS	SEXO	Feminino	92 (48,4)
		Masculino	98 (51,6)
	CRECHE	Frequente Creche	65 (34,4)
		Não Frequente creche	125 (65,6)
HÁBITOS	CHUPETA	Nunca usou/ Não usa mais	35 (19,6)
		Usa sempre / Usa para dormir	144 (80,4)
	ALEITAMENTO MATERNO	Nunca recebeu	86 (45,5)
		Recebeu / Ainda recebe	104 (54,4)
CLÍNICOS	MÁ OCLUSÃO	Ausência de má oclusão	95 (50)
		Presença de má oclusão	95 (50)
	TIPO DE MÁ OCLUSÃO	Mordida aberta anterior	59 (61,9)
		Mordida cruzada	36 (38,1)

Razões de prevalência (RP) bruta e ajustada em relação ao uso de chupeta				
VARIÁVEIS		RP bruta uso de chupeta (IC95%)	RP ajustada uso de chupeta (IC95%)	p-valor (ajustada)*
ESCOLARIDADE MATERNA	Superior ou pós-graduação	1	1	
	Primeiro grau incompleto	0,81(0,64-1,03)	0,79 (0,62-1,01)	0,057
	Primeiro grau completo	0,79(0,61-1,03)	0,78 (0,60-1,03)	0,077
	Segundo grau incompleto	0,90(0,72-1,12)	0,88 (0,72-1,09)	0,263
	Segundo grau completo	0,86(0,73-1,01)	0,86 (0,73-1,01)	0,064
ALEITAMENTO MATERNO	Ainda mama	1	1	
	Parou de mamar	1,29(1,06-1,57)	1,30((1,07-1,57)	0,007
	Nunca mamou	1,37(1,07-1,77)	1,42(1,11-1,82)	0,006

Razões de prevalência (RP) bruta e ajustada em relação à má oclusão				
VARIÁVEIS		RP bruta má oclusão (IC95%)	RP ajustada má oclusão (IC95%)	p-valor (ajustada)*
ALEITAMENTO MATERNO	Ainda mama	1	1	
	Parou de mamar	2,07(1,30-3,30)	1,90(1,15-3,14)	0,013
	Nunca mamou	2,54(1,44-4,46)	2,07(1,13-3,79)	0,018
USO DE CHUPETA	Nunca usou	1	1	
	Usa sempre	2,23(1,14-4,36)	2,02 (1,01-4,03)	0,047
	Uso noturno	3,0 (1,37-6,81)	2,51 (1,16-5,42)	0,019
SUCÇÃO DE DEDO	Já usou e parou	1,43 (0,25-8,03)	1,45 (0,42-5,00)	0,557
	Nunca	1	1	
	Sempre	1,44(0,98-2,12)	1,5(1,07-2,09)	0,019
	Sucção noturna	0,81(0,50-1,32)	0,90 (0,56-1,46)	0,679
	Já fez e parou	1,05(0,26-4,25)	2,15(0,83-5,58)	0,115

CONCLUSÃO

Há alta prevalência de má oclusão na população de crianças investigadas, sendo que o tempo de aleitamento materno atua como um fator de proteção para tal condição, enquanto o uso de chupeta está associado como fator predisponente a ocorrência da má oclusão