



Evento	Salão UFRGS 2018: SIC - XXX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2018
Local	Campus do Vale - UFRGS
Título	O impacto da doença periodontal na qualidade de vida de pacientes portadores de síndrome metabólica
Autor	ANDRÉ LUÍS ALTÍSSIMO DOS SANTOS
Orientador	RUI VICENTE OPPERMAN

O impacto da doença periodontal na qualidade de vida de pacientes portadores de síndrome metabólica.

André Luís Altíssimo dos Santos

Orientador: Rui Vicente Oppermann

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

A doença periodontal embora tenha lenta evolução, traz consigo uma série de consequências como mobilidade e perdas dentárias, mau hálito, desconforto para falar e comer. Sabe-se que esses fatores podem prejudicar o cotidiano e a qualidade de vida dos pacientes.

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o impacto da doença periodontal na qualidade de vida relacionada à saúde bucal, por meio do OHIP-14, numa amostra de pacientes portadores de Síndrome Metabólica e Periodontite de um ensaio clínico randomizado.

152 pacientes, com diagnóstico de periodontite e síndrome metabólica, foram submetidos a entrevista onde foram coletados dados sócio demográficos e comportamentais e a um exame periodontal completo. A qualidade de vida relacionada à saúde bucal foi aferida por meio do instrumento OHIP-14. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética da UFRGS e HCPA e todos os pacientes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. As variáveis sócio demográficas e comportamentais foram analisadas através de frequências e os dados clínicos periodontais por meio de média e desvio-padrão. Os resultados de OHIP-14 foram expressos por meio da soma do escore total.

A amostra foi composta por 52% de pacientes do sexo feminino, com idade média de 55 anos (± 9.14). A média de dentes presentes foi de 19.8 dentes (± 5.19) e 44.7% tinha ≤ 8 anos de estudo. Quanto aos parâmetros clínicos periodontais foi encontrado um IPV de 46.3% (± 25.46) e ISG 21.37% (± 16.98), SS 59.14% (± 24.29) e PS média de 3 mm (± 0.81) e PI média de 4 mm (± 1.55). A média do escore total de OHIP-14 foi 18.09 (± 11.92).

De acordo com os resultados, os pacientes apresentaram um perfil de inflamação gengival e periodontal, com presença de placa e sangramento além de perda de inserção e perda de elementos dentários. O escore de OHIP-14 encontrado, demonstra que a condição periodontal apresentada impactou de forma negativa aspectos da vida cotidiana desses pacientes.

Podemos concluir que a doença periodontal impactou de forma negativa a qualidade de vida relacionada à saúde bucal desta amostra de pacientes. A atenção profissional e o tratamento periodontal além de proporcionarem uma melhora na condição clínica oral e funcional do indivíduo, podem reduzir impactos negativos percebidos pelos pacientes e contribuir para melhorar a sua qualidade de vida.